

## SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

### 1. NAZIV LIJEKA

BORTEZOMIB PHARMAS 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju

### 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica sadrži 3,5 mg bortezomiba (u obliku estera boronatne kiseline i manitola).

Nakon rekonstitucije, 1 ml otopine za supkutanu injekciju sadrži 2,5 mg bortezomiba.

Nakon rekonstitucije, 1 ml otopine za intravensku injekciju sadrži 1 mg bortezomiba.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

### 3. FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za otopinu za injekciju.

Bijeli do gotovo bijeli kolačić ili prašak.

### 4. KLINIČKI PODACI

#### 4.1 Terapijske indikacije

BORTEZOMIB PHARMAS je indiciran kao monoterapija ili u kombinaciji s pegiliranim liposomalnim doksorubicinom ili deksametazonom za liječenje odraslih bolesnika s progresivnim multiplim mijelomom koji su prethodno primili najmanje jednu liniju terapije, i već su prošli transplantaciju hematopoetskih matičnih stanica ili ona za njih nije bila prikladna.

BORTEZOMIB PHARMAS je indiciran u kombinaciji s melfalanom i prednizonom za liječenje odraslih bolesnika s prethodno neliječenim multiplim mijelomom za koje nije prikladna kemoterapija u visokim dozama s transplantacijom hematopoetskih matičnih stanica.

BORTEZOMIB PHARMAS je indiciran u kombinaciji s deksametazonom ili s deksametazonom i talidomidom kao uvodno liječenje odraslih bolesnika s prethodno neliječenim multiplim mijelomom za koje je prikladna kemoterapija u visokim dozama s transplantacijom hematopoetskih matičnih stanica.

BORTEZOMIB PHARMAS je indiciran u kombinaciji s rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom za liječenje odraslih bolesnika s prethodno neliječenim limfomom plaštenih stanica za koje nije prikladna transplantacija hematopoetskih matičnih stanica.

#### 4.2 Doziranje i način primjene

Liječenje bortezomibom se mora započeti pod nadzorom liječnika koji je iskusan u liječenju bolesnika s rakom, međutim bortezomib može primijeniti zdravstveni radnik koji je iskusan u primjeni kemoterapije. BORTEZOMIB PHARMAS mora rekonstituirati zdravstveni djelatnik (vidjeti dio 6.6).

Doziranje pri liječenju progresivnog multiplog mijeloma (bolesnici koji su prethodno primili barem jednu liniju liječenja)

#### *Monoterapija*

Bortezomib prašak za otopinu za injekciju se primjenjuje putem intravenske ili supkutane injekcije uz

preporučenu dozu od 1,3 mg/m<sup>2</sup> površine tijela, dva puta tjedno tijekom dva tjedna, 1., 4., 8. i 11. dana, u ciklusu liječenja od 21 dan. To razdoblje od 3 tjedna smatra se jednim ciklusom liječenja. Preporučuje se da bolesnici prime još 2 ciklusa liječenja bortezomibom nakon potvrđenog kompletnog odgovora. Također se preporučuje da bolesnici u kojih postoji terapijski odgovor, ali nije postignuta kompletna remisija, prime ukupno 8 ciklusa terapije bortezomibom. Između dvije uzastopne doze bortezomiba mora proteći najmanje 72 sata.

#### *Prilagodbe doze za vrijeme i kod ponovnog uvođenja monoterapije*

Liječenje bortezomibom mora se prekinuti po javljanju svake nehematološke toksičnosti 3. stupnja ili bilo kakve hematološke toksičnosti 4. stupnja, isključujući neuropatiju, kako je objašnjeno u daljnjem tekstu (vidjeti također dio 4.4). Kad se simptomi toksičnosti povuku, može se ponovno uvesti liječenje bortezomibom uz dozu smanjenu za 25% (1,3 mg/m<sup>2</sup> smanjeno na 1,0 mg/m<sup>2</sup>; 1,0 mg/m<sup>2</sup> smanjeno na 0,7 mg/m<sup>2</sup>). Ako se toksičnost ne povuče ili se ponovno pojavi pri najnižoj dozi, mora se razmotriti prestanak primjene bortezomiba, osim ako je korist od liječenja neupitno veća od rizika.

#### *Neuropatska bol i/ili periferna neuropatija*

Bolesnici kod kojih se razvije neuropatska bol povezana s bortezomibom i/ili periferna neuropatija liječit će se prema uputama u tablici 1 (vidjeti dio 4.4). Bolesnici s već prisutnom teškom neuropatijom mogu se liječiti bortezomibom nakon pomne procjene omjera rizika i koristi.

*Tablica 1: Preporučene\* prilagodbe doziranja kod neuropatije povezane s bortezomibom*

| <b>Težina neuropatije</b>  | <b>Prilagodba doziranja</b>   |
|--|---|
| 1. stupanj (asimptomatski; gubitak dubokih tetivnih refleksa ili parestezija) bez bolova ili gubitka funkcije  | Nema  |
| 1. stupanj s bolovima ili 2. stupanj (umjereni simptomi; ograničavaju instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života (ADL od engl. <i>Activities of Daily Living</i> **)) | Smanjiti dozu bortezomiba na 1,0 mg/m <sup>2</sup> ili<br>Promijeniti raspored primjene bortezomiba na 1,3 mg/m <sup>2</sup> jedanput tjedno  |
| 2. stupanj s bolovima ili 3. stupanj (teški simptomi; ograničavaju aktivnosti samozbrinjavanja u svakodnevnom životu***)   | Prekinuti liječenje bortezomibom dok se simptomi toksičnosti ne povuku. Kad se toksičnost povuče, ponovno uvesti liječenje lijekom BORTEZOMIB PHARMAS i smanjiti dozu na 0,7 mg/m <sup>2</sup> jedanput tjedno. |
| 4. stupanj (po život opasne posljedice; indicirana je hitna intervencija) i/ili teška autonomna neuropatija  | Prekinuti primjenu bortezomiba  |

\* Prema prilagodbama doziranja u ispitivanjima liječenja multiplog mijeloma faze II i III i iskustvima nakon stavljanja lijeka u promet. Stupnjevanje prema Zajedničkim mjerilima toksičnosti Nacionalnog instituta za rak (engl. *NCI Common Toxicity Criteria CTCAE v 4.0*).

\*\* *Instrumentalni ADL*: odnosi se na pripremu obroka, kupnju namirnica ili odjeće, korištenje telefona, rukovanje novcem, itd;

\*\*\* *ADL samozbrinjavanja*: odnosi se na kupanje, oblačenje i svlačenje, hranjenje, odlazak na toalet, uzimanje lijekova i ne odnosi se na bolesnike koji leže nepokretni u krevetu.

#### *Kombinirano liječenje s pegiliranim liposomalnim doksorubicinom*

Bortezomib 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju primjenjuje se putem intravenske ili supkutane injekcije u preporučenoj dozi od 1,3 mg/m<sup>2</sup> površine tijela, dva puta tjedno tijekom dva tjedna, 1., 4., 8. i 11. dana, u ciklusu liječenja od 21 dan. Ovo 3 tjedno razdoblje smatra se jednim ciklusom liječenja. Između dviju uzastopnih doza bortezomiba mora proteći najmanje 72 sata.

Pegilirani liposomalni doksorubicin se primjenjuje u dozi od 30 mg/m<sup>2</sup> na 4. dan ciklusa liječenja bortezomibom, putem intravenske infuzije u trajanju od 1 sata, nakon primjene injekcije bortezomiba. Može se primijeniti do 8 ciklusa ovog kombiniranog liječenja sve dok bolesnik ne doživi progresiju i dok podnosi liječenje. Bolesnici koji postignu potpuni odgovor mogu nastaviti liječenje tijekom najmanje 2 ciklusa nakon prvog dokaza potpunog odgovora, čak i ako to zahtjeva liječenje u više od 8 ciklusa. Bolesnici čije razine paraproteina nastave padati nakon 8 ciklusa, također mogu nastaviti liječenje sve dok ga podnose i dok imaju odgovor.

Za dodatne informacije vezane uz pegilirani liposomalni doksorubicin, vidjeti odgovarajući sažetak

opisa svojstava lijeka.

#### *Kombinacija s deksametazonom*

Bortezomib 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju primjenjuje se putem intravenske ili supkutane injekcije u preporučenoj dozi od 1,3 mg/m<sup>2</sup> površine tijela, dva puta tjedno tijekom dva tjedna, 1., 4., 8. i 11. dana, u ciklusu liječenja od 21 dana. Ovo 3 tjedno razdoblje smatra se jednim ciklusom liječenja. Između dviju uzastopnih doza bortezomiba mora proteći najmanje 72 sata.

Deksametazon od 20 mg se primjenjuje oralno 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. i 12. dan tijekom ciklusa liječenja bortezomibom.

Bolesnici koji postignu odgovor ili stabilnu bolest nakon 4 ciklusa tijekom ovog kombiniranog liječenja mogu nastaviti primati istu kombinaciju tijekom maksimalno 4 dodatna ciklusa.

Za dodatne informacije vezane uz deksametazon, vidjeti odgovarajući sažetak opisa svojstava lijeka.

#### *Prilagodbe doza u kombiniranom liječenju za bolesnike s progresivnim multiplim mijelomom*

Za prilagodbu doze bortezomiba u kombiniranom liječenju slijedite smjernice za promjenu doze opisane u tekstu iznad, pod monoterapija.

#### Doziranje kod bolesnika s prethodno neliječenim multiplim mijelomom za koje transplantacija hematopoetskih matičnih stanica nije prikladna

#### *Kombinirano liječenje uz melfalan i prednizon*

Bortezomib 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju primjenjuje se u obliku intravenske ili supkutane injekcije, u kombinaciji s oralnim melfalanom i oralnim prednizonom, kao što je prikazano u tablici 2. Period od 6 tjedana predstavlja ciklus liječenja. Tijekom 1. do 4. ciklusa, bortezomib se primjenjuje dva puta tjedno, na 1., 4., 8., 11., 22., 25., 29. i 32. dan. Od 5. do 9. ciklusa, bortezomib se primjenjuje jednom tjedno, na 1., 8., 22. i 29. dan. Između dvije uzastopne doze bortezomiba, mora proteći najmanje 72 sata.

Melfalan i prednizon trebaju se primijeniti oralno 1., 2., 3. i 4. dan prvog tjedna svakog ciklusa liječenja bortezomibom. Primjenjuje se devet ciklusa ovog kombiniranog liječenja.

Tablica 2: *Preporučeno doziranje bortezomiba kada se primjenjuje u kombinaciji s melfalanom i prednizonom*

| <b>Bortezomib dva puta tjedno (1.-4. ciklus)</b> |          |        |        |        |          |         |               |          |         |          |         |               |
|--|----------|--------|--------|--------|----------|---------|---------------|----------|---------|----------|---------|---------------|
| <b>Tjedan</b>                                    | <b>1</b> |        |        |        | <b>2</b> |         | <b>3</b>      | <b>4</b> |         | <b>5</b> |         | <b>6</b>      |
| B (1,3 mg/m <sup>2</sup> )                       | 1. dan   | --     | --     | 4. dan | 8. dan   | 11. dan | period odmora | 22. dan  | 25. dan | 29. dan  | 32. dan | period odmora |
| M (9 mg/m <sup>2</sup> )                         | 1. dan   | 2. dan | 3. dan | 4. dan | --       | --      | period odmora | --       | --      | --       | --      | period odmora |
| P (60 mg/m <sup>2</sup> )                        | 1. dan   | 2. dan | 3. dan | 4. dan | --       | --      | period odmora | --       | --      | --       | --      | period odmora |

  

| <b>Bortezomib jednom tjedno (5.-9. ciklus)</b> |          |        |        |        |          |    |               |          |    |          |  |               |
|--|----------|--------|--------|--------|----------|----|---------------|----------|----|----------|--|---------------|
| <b>Tjedan</b>                                  | <b>1</b> |        |        |        | <b>2</b> |    | <b>3</b>      | <b>4</b> |    | <b>5</b> |  | <b>6</b>      |
| B (1,3 mg/m <sup>2</sup> )                     | 1. dan   | --     | --     | --     | 8. dan   |    | period odmora | 22. dan  |    | 29. dan  |  | period odmora |
| M (9 mg/m <sup>2</sup> )                       | 1. dan   | 2. dan | 3. dan | 4. dan |          | -- | period odmora |          | -- |          |  | period odmora |
| P (60 mg/m <sup>2</sup> )                      | 1. dan   | 2. dan | 3. dan | 4. dan |          | -- | period odmora |          | -- |          |  | period odmora |

B=bortezomib; M=melfalan, P=prednizon

*Prilagodbe doze za vrijeme i kod ponovnog uvođenja kombiniranog liječenja melfalanom i prednizonom*  
Prije početka novog ciklusa liječenja:

- Broj trombocita mora biti  $\geq 70 \times 10^9/l$ , a apsolutni broj neutrofila mora biti  $\geq 1,0 \times 10^9/l$ .
- Nehematološke toksičnosti moraju se povući na 1. stupanj ili početnu težinu.

Tablica 3: Prilagodbe doziranja tijekom sljedećih ciklusa liječenja bortezomibom u kombinaciji s melfalanom i prednizonom

| Toksičnost  | Prilagodba ili odgađanje doziranja   |
|---|--|
| <i>Hematološka toksičnost tijekom ciklusa</i>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se primijetilo produljeno trajanje neutropenije 4. stupnja ili trombocitopenije ili trombocitopenija s krvarenjem u prethodnom ciklusu</li> </ul>  | Razmotriti smanjenje doze melfalana za 25% u sljedećem ciklusu.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je broj trombocita <math>\leq 30 \times 10^9/l</math> ili apsolutni broj neutrofila (ABN) <math>\leq 0,75 \times 10^9/l</math> na dan primjene doze bortezomiba (osim 1. dana)</li> </ul>              | mora se prekinuti primjena bortezomiba   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se prekine primjena nekoliko doza bortezomiba u jednom ciklusu (<math>\geq 3</math> doze tijekom primjene dva puta tjedno ili <math>\geq 2</math> doze tijekom primjene jedanput na tjedan)</li> </ul> | Doza bortezomiba mora se smanjiti za jednu razinu doze (s $1,3 \text{ mg/m}^2$ na $1 \text{ mg/m}^2$ , ili s $1 \text{ mg/m}^2$ na $0,7 \text{ mg/m}^2$ )  |
| $\geq 3.$ stupanj nehematoloških toksičnosti  | Liječenje bortezomibom mora se prekinuti dok se simptomi toksičnosti ne povuku na 1. stupnja ili početnu težinu. Potom se ponovno može uvesti liječenje bortezomibom u dozi smanjenoj za jednu razinu (s $1,3 \text{ mg/m}^2$ na $1 \text{ mg/m}^2$ ili s $1 \text{ mg/m}^2$ na $0,7 \text{ mg/m}^2$ ). Kod neuropatske boli povezane s bortezomibom i/ili periferne neuropatije, pričekajte s primjenom i/ili prilagodite dozu bortezomiba kako je prikazano u Tablici 1. |

Za dodatne informacije o melfalanu i prednizonu, vidjeti odgovarajuće sažetke opisa svojstava tih lijekova.

Doziranje kod bolesnika s prethodno neliječenim multiplim mijelomom za koje je prikladna transplantacija hematopoetskih matičnih stanica (uvodno liječenje)

*Kombinirano liječenje uz deksametazon*

Bortezomib 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju se primjenjuje putem intravenske ili supkutane injekcije pri preporučenoj dozi od  $1,3 \text{ mg/m}^2$  površine tijela, dva puta tjedno tijekom dva tjedna, 1., 4., 8. i 11. dana, u ciklusu liječenja od 21 dan. Ovo razdoblje od 3 tjedna smatra se jednim ciklusom liječenja. Između dviju uzastopnih doza bortezomiba mora proteći najmanje 72 sata. Deksametazon od 40 mg se primjenjuje oralno 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. dan tijekom ciklusa liječenja bortezomibom. Primjenjuju se 4 ciklusa ovog kombiniranog liječenja.

*Kombinirano liječenje uz deksametazon i talidomid*

Bortezomib 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju se primjenjuje putem intravenske ili supkutane injekcije pri preporučenoj dozi od  $1,3 \text{ mg/m}^2$  površine tijela, dva puta tjedno tijekom dva tjedna, 1., 4., 8. i 11. dana, u ciklusu liječenja od 28 dana. Ovo razdoblje od 4 tjedna smatra se jednim ciklusom liječenja. Između dviju uzastopnih doza bortezomiba mora proteći najmanje 72 sata. Deksametazon od 40 mg se primjenjuje oralno 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. dan tijekom ciklusa liječenja bortezomibom. Talidomid se primjenjuje oralno, 50 mg dnevno, od 1. do 14. dana i, u slučaju da se podnosi, doza se povisuje na 100 mg tijekom 15.-28. dana, a potom se može dalje povisiti na 200 mg dnevno od 2. ciklusa (vidjeti Tablicu 4).

Primjenjuju se 4 ciklusa ovog kombiniranog liječenja. Preporučeno je da bolesnici s najmanje parcijalnim odgovorom prime 2 dodatna ciklusa.

Tablica 4: Doziranje za kombinirano liječenje bortezomibom za bolesnike s prethodno neliječenim multiplim mijelomom za koje je transplantacija hematopoetskih matičnih stanica prikladna

|                 |                            |                |                  |               |               |
|-----------------|----------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>B + Dx</b>   | <b>1. do 4. Ciklus</b>     |                |                  |               |               |
|                 | <b>Tjedan</b>              | <b>1</b>       | <b>2</b>         | <b>3</b>      |               |
|                 | B (1,3 mg/m <sup>2</sup> ) | Dan 1, 4       | Dan 8, 11        | Period odmora |               |
|                 | Dx 40 mg                   | Dan 1, 2, 3, 4 | Dan 8, 9, 10, 11 | -             |               |
| <b>B + Dx+T</b> | <b>1. ciklus</b>           |                |                  |               |               |
|                 | <b>Tjedan</b>              | <b>1</b>       | <b>2</b>         | <b>3</b>      | <b>4</b>      |
|                 | B (1,3 mg/m <sup>2</sup> ) | Dan 1, 4       | Dan 8, 11        | Period odmora | Period odmora |
|                 | T 50 mg                    | Dnevno         | Dnevno           | -             | -             |
|                 | T 100 mg <sup>a</sup>      | -              | -                | Dnevno        | Dnevno        |
|                 | Dx 40 mg                   | Dan 1, 2, 3, 4 | Dan 8, 9, 10, 11 | -             | -             |
|                 | <b>2. do 4.b ciklus</b>    |                |                  |               |               |
|                 | B (1,3 mg/m <sup>2</sup> ) | Dan 1, 4       | Dan 8, 11        | Period odmora | Period odmora |
|                 | T 200 mg <sup>a</sup>      | Dnevno         | Dnevno           | Dnevno        | Dnevno        |
|                 | Dx 40 mg                   | Dan 1, 2, 3, 4 | Dan 8, 9, 10, 11 | -             | -             |

B=bortezomib; Dx=deksametazon; T=talidomid

- a Doza talidomida se povisuje na 100 mg od 3. tjedna 1. ciklusa samo ako se podnosi doza od 50 mg, a na 200 mg od 2. ciklusa nadalje ako se podnosi doza od 100 mg.
- b Bolesnicima koji nakon 4 ciklusa postignu najmanje parcijalni odgovor, može se dati do 6 ciklusa

#### Prilagodbe doze za bolesnike za koje je prikladna transplantacija

Za prilagodbe doziranja bortezomiba potrebno je slijediti smjernice za promjenu doze opisane za monoterapiju.

Dodatno, kad se bortezomib primjenjuje u kombinaciji s ostalim kemoterapeutcima, u slučaju toksičnosti u obzir se moraju uzeti prikladne redukcije doza tih lijekova, u skladu s preporukama iz sažetka opisa svojstava lijeka.

#### Doziranje za bolesnike s prethodno neliječenim limfomom plaštenih stanica (MCL, od engl. *mantle cell lymphoma*)

##### *Kombinirano liječenje s rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom (BR-CAP)*

Bortezomib 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju se primjenjuje putem intravenske ili supkutane injekcije u preporučenoj dozi od 1,3 mg/m<sup>2</sup> površine tijela, dva puta tjedno tijekom dva tjedna 1., 4., 8. i 11. dana, nakon čega slijedi period odmora od 10 dana tijekom 12.-21. dana. Ovo razdoblje od 3 tjedna smatra se jednim ciklusom liječenja. Preporučuje se šest ciklusa liječenja bortezomibom, iako se bolesnicima za koje je odgovor prvi put zabilježen u 6. ciklusu, mogu dati dva dodatna ciklusa liječenja bortezomibom. Između dviju uzastopnih doza bortezomiba mora proteći najmanje 72 sata.

Sljedeći lijekovi primjenjuju se 1. dan svakog 3-tjednog ciklusa liječenja bortezomibom kao intravenske infuzije: rituksimab 375 mg/m<sup>2</sup>, ciklofosfamid 750 mg/m<sup>2</sup> i doksorubicin 50 mg/m<sup>2</sup>. Prednizon se primjenjuje peroralno, 100 mg/m<sup>2</sup> 1., 2., 3., 4. i 5. dan svakog ciklusa liječenja bortezomibom.

##### *Prilagodbe doza tijekom liječenja za bolesnike s prethodno neliječenim limfomom plaštenih stanica*

Prije započinjanja novog ciklusa liječenja:

- Broj trombocita mora biti  $\geq 100\ 000$  stanica/ $\mu$ L i apsolutni broj neutrofila mora biti  $\geq 1500$  stanica/ $\mu$ L
- Broj trombocita mora biti  $\geq 75\ 000$  stanica/ $\mu$ L u bolesnika s infiltracijom koštane srži i sa sekvestracijom u slezeni
- Hemoglobin  $\geq 8$  g/dL
- Nehematološke toksičnosti moraju se povući na 1. stupanj ili početno stanje.

Liječenje bortezomibom mora se prekinuti u slučaju nastupa bilo koje nehematološke toksičnosti  $\geq$  stupnja 3 povezane s bortezomibom (isključujući neuropatiju) ili hematološke toksičnosti  $\geq$  stupnja 3 (također vidjeti dio 4.4). Za prilagodbe doza, vidjeti Tablicu 5 ispod.

Faktori stimulacije kolonija granulocita mogu se primijeniti za hematološku toksičnost sukladno lokalnoj standardnoj praksi. Profilaktička primjena faktora stimulacije kolonija granulocita mora se uzeti u obzir kod ponovljenih zakašnjelih primjena ciklusa. Kada je klinički prikladna za liječenje trombocitopenije u obzir se mora uzeti transfuzija trombocita.

Tablica 5: Prilagodbe doza tijekom liječenja za bolesnike s prethodno neliječenim limfomom plaštenih stanica

| Toksičnosti  | Prilagodba ili odgađanje doziranja   |
|--|--|
| <i>Hematološka toksičnost</i>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>neutropenija <math>\geq</math> stupnja 3 s vrućicom, neutropenija stupnja 4 koja traje duže od 7 dana, broj trombocita <math>&lt; 10\ 000</math> stanica/<math>\mu</math>l</li> </ul>   | <p>Liječenje bortezomibom mora se prekinuti do 2 tjedna, dok bolesnik ne dostigne apsolutni broj neutrofila <math>\geq 750</math> stanica/<math>\mu</math>l i broj trombocita <math>\geq 25\ 000</math> stanica/<math>\mu</math>l.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se, nakon prestanka primjene bortezomiba, toksičnost ne povuče, kako je definirano iznad, bortezomib se mora prestati primjenjivati.</li> <li>Ako se toksičnost povuče, tj. bolesnik ima apsolutni broj neutrofila <math>\geq 750</math> stanica/<math>\mu</math>l i broj trombocita <math>\geq 25\ 000</math> stanica/<math>\mu</math>l, bortezomib se može ponovno uvesti u dozi smanjenoj za jednu razinu doze (s <math>1,3\ \text{mg}/\text{m}^2</math> na <math>1\ \text{mg}/\text{m}^2</math>, ili s <math>1\ \text{mg}/\text{m}^2</math> na <math>0,7\ \text{mg}/\text{m}^2</math>).</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je broj trombocita <math>&lt; 25\ 000</math> stanica/<math>\mu</math>l ili apsolutni broj neutrofila <math>&lt; 750</math> stanica/<math>\mu</math>l na dan primjene doze bortezomiba (različit od 1. dana svakog ciklusa)</li> </ul> | Liječenje bortezomibom mora se prekinuti   |
| <i>Nehematološke toksičnosti stupnja <math>\geq 3</math> za koje se smatra da su povezane s bortezomibom</i>   | <p>Liječenje bortezomibom mora se prekinuti dok se simptomi toksičnosti ne povuku do stupnja 2 ili manjeg. Nakon toga, bortezomib se može ponovno uvesti u dozi smanjenoj za jednu razinu doze (s <math>1,3\ \text{mg}/\text{m}^2</math> na <math>1\ \text{mg}/\text{m}^2</math>, ili s <math>1\ \text{mg}/\text{m}^2</math> na <math>0,7\ \text{mg}/\text{m}^2</math>).</p> <p>Kod neuropatske boli povezane s bortezomibom i/ili periferne neuropatije, pričekajte s primjenom i/ili prilagodite dozu bortezomiba kako je prikazano u Tablici 1.</p>   |

Dodatno, kada se bortezomib daje u kombinaciji s drugim kemoterapeuticima, u slučaju toksičnosti u obzir se moraju uzeti prikladna smanjenja doza tih lijekova, sukladno preporukama u odgovarajućem sažetku opisa svojstava lijeka.

#### Posebne populacije

##### *Stariji*

Nema dokaza koji ukazuju da je neophodna prilagodba doze u bolesnika starijih od 65 godina s multiplim mijelomom ili s limfomom plaštenih stanica.

Ne postoje ispitivanja o primjeni bortezomiba u starijih bolesnika s prethodno neliječenim multiplim mijelomom za koje je prikladna kemoterapija u visokim dozama, s transplantacijom hematopoetskih matičnih stanica. Stoga se ne mogu dati preporuke za dozu u ovoj populaciji.

U ispitivanju kod bolesnika s prethodno neliječenim limfomom plaštenih stanica, 42,9% i 10,4% bolesnika izloženih bortezomibu bilo je dobi unutar raspona 65-74 godine odnosno  $\geq 75$  godina starosti. Bolesnici u dobi  $\geq 75$  godina, su oba režima, BR-CAP kao i R-CHOP, podnosili lošije (vidjeti dio 4.8).



### Oštećenje funkcije jetre

Bolesnicima s blagim oštećenjem jetre prilagodba doze nije potrebna i treba ih liječiti preporučenim dozama. U bolesnika s umjerenim ili teškim oštećenjem jetre liječenje bortezomibom treba započeti smanjenom dozom od 0,7 mg/m<sup>2</sup> po injekciji tijekom prvog ciklusa liječenja, a naknadno povećanje doze na 1,0 mg/m<sup>2</sup> ili daljnje smanjenje doze na 0,5 mg/m<sup>2</sup> može se razmotriti na temelju podnošljivosti liječenja za bolesnika (vidjeti Tablicu 6 i dijelove 4.4 i 5.2).

Tablica 6: Preporučena prilagodba početne doze bortezomiba u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre

| Stupanj oštećenja jetre* | Razina bilirubina | Razine SGOT (AST) | Prilagodba početne doze  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Blago                    | ≤ 1,0x GGN        | > GGN             | Nema   |
|                          | > 1,0x-1,5x GGN   | bilo koja         | Nema   |
| Umjereno                 | > 1,5x-3x GGN     | bilo koja         | U prvom ciklusu liječenja smanjiti dozu bortezomiba na 0,7 mg/m <sup>2</sup> . Razmotriti povećanje doze na 1,0 mg/m <sup>2</sup> ili daljnje smanjenje doze na 0,5 mg/m <sup>2</sup> u sljedećim ciklusima na temelju bolesnikova podnošenja liječenja. |
| Teško                    | > 3x GGN          | bilo koja         |  |

Kratice: SGOT = serumski glutamat oksaloacetat transaminaza; AST = aspartat aminotransferaza; GGN = gornja granica normalnog raspona.

\* Prema klasifikaciji Radne skupine za poremećaj funkcije organa Nacionalnog instituta za rak za kategorizaciju oštećenja jetre (blago, umjereno, teško).

### Oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina [CrCL] > 20 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>) farmakokinetika bortezomiba nije promijenjena, stoga prilagodbe doze u ovih bolesnika nisu potrebne. Nije poznato je li farmakokinetika bortezomiba promijenjena u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega koji nisu na dijalizi (CrCL < 20 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>). Budući da dijaliza može smanjiti koncentracije bortezomiba, bortezomib treba primijeniti nakon postupka dijalize (vidjeti dio 5.2).

### Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost bortezomiba u djece starosti do 18 godina nisu ustanovljene (vidjeti dijelove 5.1 i 5.2). Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 5.1, ali ne mogu se dati preporuke za doziranje.

### Način primjene

Mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije rukovanja ili primjene lijeka

BORTEZOMIB PHARMAS 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju namijenjen je za intravensku ili supkutanu primjenu.

BORTEZOMIB PHARMAS se ne smije primijeniti drugim putovima primjene. Intratekalna primjena dovela je do smrti.

### Intravenska injekcija

Rekonstituirana otopina lijeka BORTEZOMIB PHARMAS 3,5 mg se primjenjuje intravenskom bolus injekcijom u trajanju od 3-5 sekundi kroz periferni ili centralni venski kateter, koji se potom mora isprati 9 mg/ml (0,9%-tnom) otopinom za injekciju natrijevog klorida. Između dvije uzastopne doze lijeka BORTEZOMIB PHARMAS, mora proći najmanje 72 sata.

### Supkutana injekcija

Rekonstituirana otopina lijeka BORTEZOMIB PHARMAS 3,5 mg se primjenjuje supkutano u bedro (desno ili lijevo) ili abdomen (desnu ili lijevu stranu). Otopina se mora injicirati supkutano, pod kutom od 45-90°. Mjesto primjene injekcije treba mijenjati kod svake uzastopne injekcije.

Ako se nakon supkutane injekcije lijeka BORTEZOMIB PHARMAS pojave reakcije na mjestu

primjene, supkutano se može primijeniti otopina lijeka BORTEZOMIB PHARMAS manje koncentracije (BORTEZOMIB PHARMAS 3,5 mg pripremiti na 1 mg/ml umjesto na 2,5 mg/ml) ili se preporučuje prelazak na intravensku injekciju.

Kada se BORTEZOMIB PHARMAS daje u kombinaciji s drugim lijekovima, za upute o primjeni tih lijekova pogledajte njihov sažetak opisa svojstava lijeka.

Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

### 4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar, na bor ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Akutna difuzna infiltrativna plućna i perikardijalna bolest.

Kada se bortezomib primjenjuje u kombinaciji s drugim lijekovima, za dodatne kontraindikacije pogledajte sažetke opisa svojstava lijeka tih lijekova.

### 4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Kada se bortezomib primjenjuje u kombinaciji s drugim lijekovima, prije započinjanja liječenja bortezomibom morate se konzultirati sa sažetkom opisa svojstava lijeka tih lijekova. Kada se primjenjuje talidomid, potrebna je posebna pažnja vezana uz mjere prevencije i testiranje na trudnoću (vidjeti dio 4.6).

#### *Intratekalna primjena*

Nenamjerna intratekalna primjena bortezomiba rezultirala je smrtnim slučajevima. Bortezomib 1 mg prašak za otopinu za injekciju primjenjuje se samo intravenski, dok se Bortezomib 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju primjenjuje intravenski ili supkutano. Bortezomib se ne smije primijeniti intratekalno.

#### *Gastrointestinalna toksičnost*

Gastrointestinalna toksičnost, uključujući mučninu, proljev, povraćanje i zatvor, vrlo su česti kod liječenja bortezomibom. Manje često su prijavljeni slučajevi ileusa (vidjeti dio 4.8). Stoga bolesnike kod kojih se pojavi zatvor treba pomno pratiti.

#### *Hematološka toksičnost*

Liječenje bortezomibom vrlo je često povezano s hematološkim toksičnostima (trombocitopenija, neutropenija i anemija). U ispitivanjima s bolesnicima s relapsom multiplog mijeloma liječenih s bortezomibom i s bolesnicima s prethodno neliječenim limfomom plaštenih stanica liječenih s bortezomibom u kombinaciji s rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom (BR-CAP), jedna od najčešćih hematoloških toksičnosti bila je prolazna trombocitopenija. Trombociti su bili najniži 11. dana svakog ciklusa liječenja bortezomibom i obično su se povukli do početnog stanja do sljedećeg ciklusa. Nije bilo dokaza kumulativne trombocitopenije. U ispitivanjima multiplog mijeloma s jednim lijekom najniža izmjerena srednja vrijednost broja trombocita bila je približno 40% početne vrijednosti a 50% u ispitivanju limfoma plaštenih stanica. U bolesnika s uznapredovalim mijelomom, težina trombocitopenije bila je povezana s brojem trombocita prije liječenja: kod početnog broja trombocita < 75 000/ $\mu$ l, 90% od 21 bolesnika imalo je  $\leq$  25 000/ $\mu$ l trombocita za vrijeme ispitivanja, uključujući njih 14% s < 10 000/ $\mu$ l; nasuprot tome, kod početnog broja trombocita > 75 000/ $\mu$ l, samo 14% od 309 bolesnika imalo je  $\leq$  25 000/ $\mu$ l trombocita za vrijeme ispitivanja.

U bolesnika s limfomom plaštenih stanica (ispitivanje LYM-3002), postojala je viša incidencija (56,7% naspram 5,8%) trombocitopenije stupnja  $\geq$  3 u skupini liječenoj bortezomibom (BR-CAP) u usporedbi sa skupinom koja nije liječena bortezomibom (rituksimab, ciklofosfamid, doksorubicin, vinkristin i prednizon [R-CHOP]). Dvije liječene skupine imale su sličnu ukupnu incidenciju događaja krvarenja svih stupnjeva (6,3% u BR-CAP skupini i 5,0% u R-CHOP skupini) kao i stupnja 3 i višeg za događaje krvarenja (BR-CAP: 4 bolesnika [1,7%]; R-CHOP: 3 bolesnika [1,2%]). U BR-CAP skupini, 22,5% bolesnika primilo je transfuzije trombocita u usporedbi s 2,9% bolesnika u R-CHOP skupini.



Gastrointestinalno i intracerebralno krvarenje bilo je prijavljeno u vezi s liječenjem bortezomibom. Stoga, prije svake doze bortezomiba potrebno je pratiti broj trombocita. Liječenje bortezomibom mora se prekinuti kad je broj trombocita  $< 25\ 000/\mu\text{l}$ , a u slučaju kombinacije s melfalanom i prednizonom kad je broj trombocita  $\leq 30\ 000/\mu\text{l}$  (vidjeti dio 4.2). Moguću korist od liječenja treba pažljivo ocijeniti u odnosu na rizik, osobito u slučaju umjerene do teške trombocitopenije i čimbenika rizika za krvarenje.

Za vrijeme liječenja bortezomibom potrebno je često određivati kompletnu i diferencijalnu krvnu sliku (KKS), uključujući broj trombocita. Transfuzija trombocita mora se uzeti u obzir kada je klinički prikladna (vidjeti dio 4.2).

U bolesnika s limfomom plaštenih stanica, zabilježena je prolazna reverzibilna neutropenija između ciklusa, bez dokaza kumulativne neutropenije. Neutrofili su bili najniži 11. dan svakog ciklusa liječenja bortezomibom i obično su se povukli na početnu vrijednost do sljedećeg ciklusa. U ispitivanju LYM-3002, potpora u vidu faktora stimulacije kolonija primijenjena je na 78% bolesnika u BR-CAP skupini te na 61% bolesnika u R-CHOP skupini. Budući da bolesnici s neutropenijom imaju povećan rizik od infekcija, oni se moraju nadzirati na znakove i simptome infekcije, te što prije liječiti. Faktori stimulacije kolonija granulocita mogu se primijeniti za hematološku toksičnost sukladno lokalnoj standardnoj praksi. Profilaktička primjena faktora stimulacije kolonija granulocita mora se uzeti u obzir kod ponovljenih zakašnjelih primjena ciklusa (vidjeti dio 4.2).

#### *Reaktivacija virusa herpes zoster*

U bolesnika koji se liječe bortezomibom preporučuje se antivirusna profilaksa.

U ispitivanju faze III kod bolesnika s prethodno neliječenim multiplim mijelomom, ukupna incidencija reaktivacije virusa herpes zoster bila je češća u bolesnika koji su primali bortezomib+melfalan+prednizon nego u onih koji su primali melfalan+prednizon (14% naspram 4%).

U bolesnika s limfomom plaštenih stanica (ispitivanje LYM-3002), incidencija infekcije virusom herpes zoster bila je 6,7% u BR-CAP skupini i 1,2% u R-CHOP skupini (vidjeti dio 4.8).

#### *Reaktivacija virusa hepatitisa B (HBV) i infekcija*

Kada se rituksimab koristi u kombinaciji s bortezomibom, u bolesnika koji imaju rizik od infekcije s HBV-om, prije početka liječenja uvijek se mora provoditi probir na HBV. Nositelji hepatitisa B i bolesnici s hepatitisom B u anamnezi, moraju se strogo nadzirati na kliničke i laboratorijske znakove aktivne infekcije HBV-om tijekom i nakon kombiniranog liječenja rituksimaba i bortezomiba. Mora se uzeti u obzir antivirusna profilaksa. Za više informacija pogledajte sažetak opisa svojstava lijeka za rituksimab.

#### *Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML)*

Vrlo rijetko su bili zabilježeni slučajevi John Cunningham (JC) virusne infekcije nepoznate uzročnosti, koji su rezultirali progresivnom multifokalnom leukoencefalopatijom (PML) i smrću kod bolesnika liječenih bortezomibom. Bolesnici kojima je dijagnosticirana PML, prethodno ili konkomitantno su uzimali imunosupresivnu terapiju. Većina slučajeva PMLa bila je dijagnosticirana unutar 12 mjeseci od primjene prve doze bortezomiba. Bolesnike je potrebno redovito pratiti radi mogućnosti pojave novih ili pogoršanja postojećih neuroloških simptoma ili znakova koji mogu upućivati na PML, kao dio diferencijalne dijagnoze problema SŽS-a. Ako se sumnja na PML, bolesnika je potrebno uputiti na specijalistički pregled, te započeti odgovarajuće dijagnostičke postupke za PML. Ako je dijagnosticiran PML, liječenje bortezomibom treba prekinuti.

#### *Periferna neuropatija*

Liječenje bortezomibom vrlo je često povezano s perifernom neuropatijom, koja je pretežno senzorna. Međutim, prijavljeni su slučajevi teške motorne neuropatije s ili bez senzorne periferne neuropatije. Incidencija periferne neuropatije povećava se u početku liječenja, a primijećeno je da je najveća tijekom 5. ciklusa.

Preporučuje se pažljivo praćenje bolesnika zbog simptoma neuropatije kao što su osjećaj žarenja, hiperestezija, hipoestezija, parestezija, nelagoda, neuropatska bol ili slabost.

U ispitivanju faze III uspoređena je intravenska primjena bortezumiba u odnosu na supkutanu primjenu, incidencija periferne neuropatije stupnja  $\geq 2$  bila je 24% u skupini sa supkutanom primjenom injekcije i 41% u intravenskoj skupini ( $p=0,0124$ ). Periferna neuropatija stupnja  $\geq 3$  pojavila se kod 6% bolesnika u skupini liječenoj supkutanom, u usporedbi sa 16% u skupini liječenoj intravenski ( $p=0,0264$ ). Incidencija periferne neuropatije svih stupnjeva uz intravensku primjenu bortezumiba bila je niža u prethodnim ispitivanjima s bortezumibom primijenjenim intravenski, nego u ispitivanju MMY-3021.

Bolesnike kod kojih se pojavi nova ili im se pogorša postojeća periferna neuropatija mora se neurološki pregledati, a po potrebi im treba promijeniti dozu, vremenski raspored primjene ili promijeniti put primjene na supkutani (vidjeti dio 4.2). Neuropatiju se liječilo potpornim mjerama i drugim terapijama.

U bolesnika koji primaju bortezumib u kombinaciji s lijekovima za koje je poznato da su povezani s neuropatijom (npr. talidomidom), mora se razmotriti rano i redovito praćenje, neurološkom procjenom, simptoma neuropatije proizašlih tijekom liječenja, te se u obzir mora uzeti prikladno smanjenje doze ili prekid liječenja.

Uz perifernu neuropatiju, nekim nuspojavama može pridonijeti i autonomna neuropatija, kao što je posturalna hipotenzija i teški zatvor s ileusom. Podaci o autonomnoj neuropatiji i njezinom doprinosu tim nuspojavama su ograničeni.

#### *Napadaji*

Epileptički napadaji su manje često prijavljeni u bolesnika bez prethodnih epileptičkih napadaja ili epilepsije u anamnezi. Poseban nadzor je potreban u liječenju bolesnika s nekim od čimbenika rizika za nastanak epileptičkih napadaja.

#### *Hipotenzija*

Liječenje bortezumibom često je povezano s ortostatskom/posturalnom hipotenzijom. Većina nuspojava je blage do umjerene naravi i bilježe se tijekom cijelog liječenja. Bolesnici koji su razvili ortostatsku hipotenziju za vrijeme liječenja bortezumibom (injiciran intravenski) nisu imali znakove ortostatske hipotenzije prije liječenja bortezumibom. U većine je bolesnika bilo potrebno liječiti ortostatsku hipotenziju. Manjina bolesnika s ortostatskom hipotenzijom doživjela je sinkope. Ortostatska/posturalna hipotenzija nije bila akutno povezana s bolus infuzijom bortezumiba. Mehanizam ovog događaja nije poznat, premda djelomično može biti posljedica autonomne neuropatije. Autonomna neuropatija može biti povezana s bortezumibom ili bortezumib može pogoršati postojeće stanje kao što su dijabetička neuropatija ili neuropatija kod amiloidoze. Savjetuje se oprez kad se liječe bolesnici koji imaju sinkopu u anamnezi i primaju lijekove za koje se zna da su povezani s hipotenzijom ili koji su dehidrirani zbog rekurentnog proljeva ili povraćanja. Liječenje ortostatske/posturalne hipotenzije može uključivati prilagodbu antihipertenzivnih lijekova, rehidraciju ili primjenu mineralokortikoida i/ili simpatomimetika. Bolesnike se mora uputiti da potraže liječnički savjet ako osjete simptome omaglice, ošamućenosti ili nesvjestice.

#### *Sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES, od engl. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome)*

Bili su prijavljeni slučajevi sindroma posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES) kod bolesnika koji su primali bortezumib. PRES je rijetko neurološko stanje koje je često reverzibilno, brzo se razvija, a može biti predstavljeno napadajima, hipertenzijom, glavoboljom, letargijom, smetenošću, sljepoćom i drugim poremećajima vida i neurološkim poremećajima. Za potvrdu dijagnoze koristi se prikaz mozga, po mogućnosti magnetska rezonanca (MRI, od engl. *Magnetic Resonance Imaging*). U bolesnika u kojih se razvije PRES, mora se prekinuti primjena bortezumiba.

#### *Zatajenje srca*

Tijekom liječenja bortezumibom prijavljen je akutni razvoj ili egzacerbacija kongestivnog zatajenja srca i/ili novonastalo smanjenje ejske frakcije lijevog ventrikula. Zadržavanje tekućine može biti predisponirajući čimbenik za pojavu znakova i simptoma zatajenja srca. Bolesnike s čimbenicima rizika za razvoj ili s postojećom bolešću srca mora se pomno pratiti.

#### *Elektrokardiografske pretrage*

U kliničkim ispitivanjima prijavljeni su izolirani slučajevi produljenja QT intervala, ali uzročno posljedična povezanost nije ustanovljena.

#### *Plućni poremećaji*

U rijetkim slučajevima prijavljena je akutna difuzna infiltrativna bolest pluća nepoznate etiologije, kao što je pneumonitis, intersticijska pneumonija, infiltracija pluća i akutni respiratorni distres sindrom (ARDS) u bolesnika koji su primali borteomibom (vidjeti dio 4.8). Neki od tih događaja imali su smrtni ishod. Preporučuje se napraviti rendgenogram pluća prije liječenja, da posluži kao početni nalaz u slučaju mogućih plućnih promjena nakon liječenja.

U slučaju pojave novih ili pogoršanja postojećih plućnih simptoma (npr. kašalj, dispneja), bolesnicima se mora napraviti brza dijagnostička obrada, te ih je potrebno liječiti na odgovarajući način. Potrebno je razmotriti omjer koristi i rizika prije nastavka liječenja borteomibom.

Tijekom kliničkog ispitivanja, dvoje bolesnika (od 2) koji su primali visoku dozu citarabina (2 g/m<sup>2</sup> na dan) kontinuiranom infuzijom u trajanju od 24 sata s daunorubicinom i borteomibom zbog relapsa akutne mijeloične leukemije umrla su od ARDS na početku liječenja, a ispitivanje je bilo prekinuto. Stoga se ne preporučuje ovaj kombinirani režim s istodobnom primjenom visokih doza citarabina (2 g/m<sup>2</sup> na dan) kontinuiranom infuzijom u trajanju od 24 sata.

#### *Oštećenje funkcije bubrega*

Bubrežne komplikacije česte su u bolesnika s multiplim mijelomom. Bolesnike s oštećenjem bubrega treba pomno pratiti (vidjeti dijelove 4.2 i 5.2).

#### *Oštećenje funkcije jetre*

Borteomib se metabolizira putem enzima jetre. Izloženost borteomibu povećana je u bolesnika s umjereno ili teško oštećenom jetrom; te bolesnike treba liječiti smanjenim dozama borteomiba i pomno ih pratiti na znakove toksičnosti (vidjeti dijelove 4.2 i 5.2).

#### *Jetrene reakcije*

U rijetkim je slučajevima zabilježeno zatajenje jetre u bolesnika s ozbiljnim podležećim zdravstvenim stanjem koji su istodobno primali borteomibom i konkomitantne lijekove. Druge prijavljene jetrene reakcije uključuju povišenje jetrenih enzima, hiperbilirubinemiju i hepatitis. Takve promjene mogu biti reverzibilne nakon prekida liječenja borteomibom (vidjeti dio 4.8).

#### *Sindrom lize tumora*

Budući da je borteomib citotoksično sredstvo i može brzo uništiti zloćudne plazma stanice i stanice limfoma plaštenih stanica, mogu se pojaviti komplikacije zbog sindroma lize tumora. Rizik od sindroma lize tumora postoji u bolesnika s velikom tumorskom masom prije liječenja. Te je bolesnike potrebno pomno pratiti i poduzeti odgovarajuće mjere opreza.

#### *Istodobno primijenjeni lijekovi*

Bolesnike treba pomno pratiti kada primaju borteomib u kombinaciji s jakim inhibitorima enzima CYP3A4. Potrebno je oprez kad se borteomib kombinira sa supstratima enzima CYP3A4- ili CYP2C19 (vidjeti dio 4.5).

Potrebno je potvrditi normalnu funkciju jetre i s oprezom pristupiti bolesnicima koji uzimaju oralne hipoglikemike (vidjeti dio 4.5).

#### *Reakcije koje bi mogle biti posredovane imunokompleksima*

Manje su često prijavljene reakcije koje bi mogle biti posredovane imunokompleksima, kao što su reakcija tipa serumske bolesti, poliartritis s osipom i proliferativni glomerulonefritis. Primjena borteomiba mora se prekinuti ako se pojave ozbiljne reakcije.

#### 4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

*In vitro* ispitivanja pokazuju da je borteomib slabi inhibitor izoenzima citokroma P450 (CYP) 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4. Na osnovi ograničenog doprinosa (7%) enzima CYP2D6 metabolizmu borteomiba, ne očekuje se da će fenotip slabog CYP2D6 metabolizatora utjecati na cjelokupnu raspoloživost borteomiba.

Ispitivanje interakcija lijekova kojim se procjenjivao učinak ketokonazola, jakog CYP3A4 inhibitora na farmakokinetiku borteomiba (primijenjenog intravenski), pokazalo je prosječno povećanje AUC borteomiba za 35% (CI<sub>90%</sub> [1,032 do 1,772]) na temelju podataka o 12 bolesnika. Stoga je potrebno pomno pratiti bolesnike kad im se daje borteomib u kombinaciji s jakim inhibitorima enzima CYP3A4 (npr. ketokonazol, ritonavir).

U ispitivanju interakcija lijekova kojim se procjenjivao učinak omeprazola, jakog inhibitora CYP2C19 na farmakokinetiku borteomiba (primijenjenog intravenski), nije bilo značajnog učinka na farmakokinetiku borteomiba na temelju podataka o 17 bolesnika.

Ispitivanje interakcija lijekova kojim se procjenjivao učinak rifampicina, jakog CYP3A4 induktora, na farmakokinetiku borteomiba (primijenjenog intravenski), pokazalo je prosječno smanjenje AUC borteomiba za 45% na temelju podataka o 6 bolesnika. Stoga se ne preporučuje istodobna primjena borteomiba i jakih induktora enzima CYP3A4 (npr. rifampicina, karbamazepina, fenitoina, fenobarbitala i Gospine trave), jer djelotvornost može biti smanjena.

U istom ispitivanju interakcija lijekova u kojem se procjenjivao učinak deksametazona, slabijeg induktora CYP3A4, na farmakokinetiku borteomiba (primijenjenog intravenski), nije bilo značajnog učinka na farmakokinetiku borteomiba na temelju podataka o 7 bolesnika.

Ispitivanje interakcija lijekova u kojem se procjenjivao učinak melfalana i prednizona na farmakokinetiku borteomiba (primijenjenog intravenski), pokazalo je srednje povećanje AUC borteomiba od 17% na temelju podataka o 21 bolesniku. To se ne smatra klinički značajnim.

Tijekom kliničkih ispitivanja, hipoglikemija je bila manje često, a hiperglikemija često zabilježena u bolesnika s dijabetesom koji su primali oralne hipoglikemike. U bolesnika na terapiji oralnim antidijabeticima koji se liječe borteomibom može biti potrebno pomno praćenje razine glukoze u krvi i prilagodba doze antidijabetika.

##### Pedijatrijska populacija

Ispitivanja interakcija provedena su samo u odraslih.

#### 4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

##### Kontracepcija u muškaraca i žena

Muškarci i žene reproduktivne dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom liječenja i do 3 mjeseca nakon liječenja.

##### Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o izloženosti borteomibu tijekom trudnoće. Teratogeni potencijal borteomiba nije u potpunosti istražen.

U nekliničkim ispitivanjima borteomib nije imao učinke na embrionalno/fetalni razvoj štakora i kunića pri najvišim dozama koje su ženke mogle podnijeti. Nisu provedena ispitivanja na životinjama koja bi utvrdila učinak borteomiba na porod i postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3). Borteomib se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće, osim ako kliničko stanje žene ne zahtijeva liječenje borteomibom. Ako se borteomib primjenjuje tijekom trudnoće ili ako bolesnica zatrudni za vrijeme primanja ovog lijeka, bolesnicu se mora upozoriti na mogući rizik za fetus.

Talidomid je poznata teratogena djelatna tvar za ljude koja uzrokuje teška po život opasna oštećenja po rođenju. Talidomid je kontraindiciran tijekom trudnoće i u žena s reproduktivnim potencijalom osim

ako nisu postignuti svi uvjeti talidomidskog programa prevencije trudnoće. Bolesnici koji primaju bortezomib u kombinaciji s talidomidom moraju se pridržavati programa za sprječavanje trudnoće. Za dodatne informacije pogledajte sažetak opisa svojstava lijeka za talidomid.

#### Dojenje

Nije poznato izlučuje li se bortezomib u majčino mlijeko. Zbog mogućnosti ozbiljnih nuspojava u dojene djece, za vrijeme liječenja bortezomibom potrebno je prekinuti dojenje.

#### Plodnost

Nisu provedena ispitivanja utjecaja bortezomiba na plodnost (vidjeti dio 5.3).

### **4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima**

Bortezomib može umjereno utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Bortezomib može vrlo često biti povezan s umorom, često s omaglicom, manje često sa sinkopom i često s ortostatskom/posturalnom hipotenzijom ili zamagljenim vidom. Stoga bolesnici moraju biti oprezni kad upravljaju vozilima ili rade sa strojevima i potrebno im je savjetovati da ne voze i ne upravljaju strojevima ako dožive te simptome (vidjeti dio 4.8).

### **4.8 Nuspojave**

#### Sažetak sigurnosnog profila

Ozbiljne nuspojave koje su manje često bile prijavljene tijekom liječenja bortezomibom uključuju zatajenje srca, sindrom lize tumora, plućnu hipertenziju, sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije, akutne difuzne infiltrativne plućne poremećaje i rijetku autonomnu neuropatiju. Najčešće prijavljene nuspojave tijekom liječenja bortezomibom jesu mučnina, proljev, zatvor, povraćanje, umor, pireksija, trombocitopenija, anemija, neutropenija, periferna neuropatija (uključujući senzornu), glavobolja, parestezija, smanjeni apetit, dispneja, osip, herpes zoster i mialgija.

#### Tablični sažetak nuspojava

##### *Multipli mijelom*

Za nuspojave u Tablici 7 ispitivači su smatrali da postoji barem mogućnost ili vjerojatnost uzročno-posljedične povezanosti s bortezomibom. Ove nuspojave temelje se na integriranom setu podataka od 5476 bolesnika od kojih je 3996 bilo liječeno bortezomibom u dozi 1,3 mg/m<sup>2</sup> te je uvršteno u Tablicu 7.

Sveukupno, bortezomib je primijenjen za liječenje multiplog mijeloma u 3974 bolesnika.

Nuspojave u daljnjem tekstu navedene su prema klasifikaciji organskih sustava i skupini učestalosti. Učestalost se definira kao: vrlo često ( $\geq 1/10$ ); često ( $\geq 1/100$  i  $< 1/10$ ); manje često ( $\geq 1/1000$  i  $< 1/100$ ); rijetko ( $\geq 1/10\ 000$  i  $< 1/1000$ ); vrlo rijetko ( $< 1/10\ 000$ ), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti. Temelj za izradu tablice 7 bila je verzija 14.1 MedDRAe.

Također su uključene nuspojave zabilježene nakon stavljanja lijeka u promet, a koje nisu bile primijećene u kliničkim ispitivanjima.

*Tablica 7: Nuspojave u bolesnika s multiplim mijelomom koji su liječeni bortezomibom u kliničkim ispitivanjima i nuspojave nakon stavljanja lijeka u promet neovisno o indikaciji<sup>#</sup>*

| <b>Klasifikacija organskih sustava</b> | <b>Incidencija</b> | <b>Nuspojava</b>   |
|--|--------------------|--|
| Infekcije i infestacije                | Često              | Herpes zoster (uključujući diseminirani i oftalmički), pneumonija*, herpes simpleks*, gljivična infekcija* |



|   |             |  |
|---|-------------|--|
|   | Manje često | Infekcija*, bakterijske infekcije*, virusne infekcije *, sepsa (uključujući septički šok)*, bronhopneumonija, infekcija virusom herpesa*, herpetični meningoencefalitis#, bakterijemija (uključujući stafilokoknu), hordeolum (ječmenac), influenza, celulitis, infekcija povezana s proizvodom, kožna infekcija*, infekcija uha*, infekcija stafilokokom, infekcija zuba* |
|   | Rijetko     | Meningitis (uključujući bakterijski), infekcija Epstein-Barrovim virusom, genitalni herpes, tonzilitis, mastoiditis, sindrom umora nakon virusa  |
| Dobročudne, zloćudne i nespecificirane novotvorine (uključujući ciste i polipe) | Rijetko     | Zloćudna novotvorina, plazmocitna leukemija, karcinom renalnih stanica, izraslina, Mycosis fungoides, dobroćudna novotvorina*  |
| Poremećaji krvi i limfnog sustava   | Vrlo često  | Trombocitopenija *, neutropenija *, anemija*   |
|   | Često       | Leukopenija*, limfopenija *  |
|   | Manje često | Pancitopenija*, febrilna neutropenija, koagulopatija*, leukocitoza*, limfadenopatija, hemolitička anemija#   |
|   | Rijetko     | Diseminirana intravaskularna koagulacija, trombocitoza*, sindrom hiperviskoznosti, nespecificirani poremećaj trombocita, trombotička mikroangiopatija (uključujući trombocitopenijsku purpuru)#, nespecificirani poremećaji krvi hemoragijska diateza  |
| Poremećaji imunološkog sustava  | Manje često | Angioedem#, preosjetljivost*   |
|   | Rijetko     | Anafilaktički šok, amiloidoza, reakcija tipa III posredovana imunokompleksima  |
| Endokrini poremećaji  | Manje često | Cushingov sindrom*, hipertireoza*, neadekvatno lučenje antidiuretskog hormona  |
|   | Rijetko     | Hipotireoza  |
| Poremećaji metabolizma i prehrane   | Vrlo često  | Smanjeni apetit  |
|   | Često       | Dehidracija, hipokalijemija*, hiponatrijemija*, abnormalna glukoza u krvi*, hipokalcijemija*, abnormalni enzimi*,  |
|   | Manje često | Sindrom lize tumora, izostanak uspješnog rasta*, hipomagenzijemija*, hipofosfatemija*, hiperkalijemija*, hiperkalcijemija*, hipernatrijemija*, abnormalna mokraćna kiselina*, dijabetes melitus*, zadržavanje tekućine   |
|   | Rijetko     | Hipermagnezijemija*, acidoza, neravnoteža elektrolita*, preopterećenje tekućinom, hipokloremija*, hipovolemija, hiperkloremija*, hiperfosfatemija*, poremećaj metabolizma, nedostatak vitamina B kompleksa, nedostatak vitamina B12, giht, pojačani apetit, netolerancija na alkohol   |
| Psihijatrijski poremećaji   | Često       | Poremećaji i smetnje raspoloženja *, anksiozni poremećaj*, poremećaji i smetnje spavanja*  |
|   | Manje često | Mentalni poremećaj*, halucinacije*, psihotični poremećaj*, konfuzija*, nemir   |
|   | Rijetko     | Suicidne misli*, poremećaj prilagodbe, delirij, smanjen libido   |
| Poremećaji živčanog sustava   | Vrlo često  | Neuropatije*, periferna senzorna neuropatija, dizestezija*, neuralgija*  |
|   | Često       | Motorna neuropatija*, gubitak svijesti (uključujući sinkopu), omaglica*, disgeuzija*, letargija, glavobolja*   |



|                                      |             |   |
|--------------------------------------|-------------|---|
|                                      | Manje često | tremor, periferna senzoričko-motorna neuropatija, diskinezija*, smetnje koordinacije i ravnoteže u malom mozgu *, gubitak pamćenja (isključujući demenciju)*, encefalopatija*, sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije#, neurotoksičnost, poremećaji s epileptičkim napadajima*, postherpetička neuralgija, poremećaj govora*, sindrom nemirnih nogu, migrena, išijas, poremećaj pozornosti, abnormalni refleksi*, parosmija  |
|                                      | Rijetko     | Cerebralno krvarenje *, intrakranijalno krvarenje (uključujući subarahnoidalno)*, edem mozga, tranzitorni ishemijski napadaj, koma, neravnoteža autonomnog živčanog sustava, autonomna neuropatija, kranijalna paraliza*, paraliza*, pareza*, presinkopa, sindrom moždanog debla, cerebrovaskularni poremećaj, lezije korijena živca, psihomotorna hiperaktivnost, kompresija kralježnične moždine, nespecificirani kognitivni poremećaj, motorna disfunkcija, nespecificirani poremećaj živčanog sustava, radikulitis, slinjenje, hipotonija |
| Poremećaji oka                       | Često       | Oticanje oka*, abnormalan vid*, konjunktivitis*   |
|                                      | Manje često | Krvarenje u oku*, infekcija kapka*, halacion#, blefaritis#, upala oka*, diplopija, suho oko*, iritacija oka*, bolno oko, pojačano suzenje, iscjedak iz oka  |
|                                      | Rijetko     | Kornealne lezije*, egzoftalmus, retinitis, skotom, nespecificirani poremećaj oka (uključujući kapak), stečeni dakrioadenitis, fotofobija, fotopsija, optička neuropatija#, različiti stupnjevi oštećenja vida (do sljepoće)*  |
| Poremećaji uha i labirinta           | Često       | Vertigo*  |
|                                      | Manje često | Disakuzija (uključujući tinitus)*, oštećenje sluha (do i uključujući gluhoću), nelagoda uha*  |
|                                      | Rijetko     | Krvarenje u uhu, vestibularni neuronitis, nespecificirani poremećaj uha   |
| Srčani poremećaji                    | Manje često | Tamponada srca#, kardiopulmonalni arrest *, fibrilacija srca (uključujući atrijsku), srčano zatajenje (uključujući lijevo i desno ventrikularno)*, aritmija*, tahikardija*, palpitacije, angina pectoris, perikarditis (uključujući perikardijalni izljev)*, kardiomiopatija*, ventrikularna disfunkcija*, bradikardija   |
|                                      | Rijetko     | Undulacija atriya, infarkt miokarda*, atrioventrikularni blok*, kardiovaskularni poremećaj (uključujući kardiogeni šok), <i>Torsade de pointes</i> , nestabilna angina, poremećaji srčanih zalistaka*, insuficijencija koronarnih arterija, sinusni arrest  |
| Krvožilni poremećaji                 | Često       | Hipotenzija*, ortostatska hipotenzija, hipertenzija *   |
|                                      | Manje često | Cerebrovaskularni događaj#, duboka venska tromboza*, krvarenje*, tromboflebitis (uključujući površinski), kolaps cirkulacije (uključujući hipovolemijski šok), flebitis, crvenilo uz osjećaj vrućine*, hematomi (uključujući perirenalne)*, slaba periferna cirkulacija*, vaskulitis, hiperemija (uključujući okularna)*  |
|                                      | Rijetko     | Periferna embolija, limfedem, bljedoća, eritromelalgija, vazodilatacija, diskoloracija vena, venska insuficijencija   |
| Poremećaji dišnog sustava, prsišta i | Često       | Dispneja*, epistaksa, infekcija gornjih/donjih dišnih puteva*, kašalj*  |

|                                       |             |   |
|---------------------------------------|-------------|---|
| sredoprsja                            | Manje često | Plućna embolija, pleuralni izljev, plućni edem (uključujući akutni), plućno alveolarno krvarenje#, bronhospazam, kronična opstruktivna bolest pluća*, hipoksemija*, kongestija dišnih puteva*, hipoksija, pleuritis*, štucanje, rinoreja, disfonija, piskanje   |
|                                       | Rijetko     | Respiracijska insuficijencija, akutni respiratorni distres sindrom, apneja, pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptiza, hiperventilacija, ortopneja, pneumonitis, respiratorna alkalozna, tahipneja, plućna fibroza, bronhijalni poremećaj*, hipokapnija*, intersticijska bolest pluća, infiltracija pluća, stezanje u grlu, suhoća grla, povećana sekrecija gornjih dišnih puteva, iritacija grla, sindrom gornjih dišnih puteva koji je uzrok kašlja  |
| Poremećaji probavnog sustava          | Vrlo često  | Mučnina i simptomi povraćanja*, proljev*, konstipacija  |
|                                       | Često       | Gastrointestinalno krvarenje (uključujući mukozno)*, dispepsija, stomatitis*, distenzija abdomena, orofaringealna bol*, bolovi u abdomenu (uključujući gastrointestinalnu bol i bol slezene)*, poremećaj u ustima*, flatulencija  |
|                                       | Manje često | Pankreatitis (uključujući kronični)*, hematemeza, oticanje usnica*, gastrointestinalna opstrukcija (uključujući opstrukciju tankog crijeva, ileus)*, nelagoda u abdomenu, ulceracije u ustima*, enteritis*, gastritis*, krvarenje desni, gastroezofagealna refluksna bolest*, kolitis (uključujući clostridium difficile)*, ishemijski kolitis#, gastrointestinalna upala*, disfagija, sindrom iritabilnog crijeva, nespecificirani gastrointestinalni poremećaj, obložen jezik, poremećaj gastrointestinalne pokretljivosti*, poremećaj žlijezda slinovnica* |
|                                       | Rijetko     | Akutni pankreatitis, peritonitis*, edem jezika*, ascites, ezofagitis, heilitis, nemogućnost kontroliranja stolice, atonija analnog sfinktera, fekalom*, gastrointestinalna ulceracija i perforacija*, gingivalna hipertrofija, megakolon, rektalni iscjedak, orofaringealni mjehurići*, bol usnica, periodontitis, analna fisura, promjene uobičajenog rada crijeva, proktalgija, abnormalna stolica  |
| Poremećaji jetre i žuči               | Često       | Abnormalni jetreni enzimi*  |
|                                       | Manje često | Hepatotoksičnost (uključujući poremećaj jetre), hepatitis*, kolestaza   |
|                                       | Rijetko     | Zatajenje jetre, hepatomegalija, Budd-Chiarijev sindrom, citomegalovirusni hepatitis, krvarenje jetre, kolelitijaza   |
| Poremećaji kože i potkožnog tkiva     | Često       | Osip*, pruritus*, eritem, suha koža   |
|                                       | Manje često | Multiformni eritem, urtikarija, akutna febrilna neutrofilna dermatoza, izbijanje kožnih promjena uzrokovano toksičnim učinkom lijeka, toksična epidermalna nekroliza#, Stevens-Johnsonov sindrom#, dermatitis*, poremećaj dlake*, petehije, ekhimoza, lezije kože, purpura, kožna masa*, psorijaza, hiperhidroza, noćno znojenje, dekubitalni ulkus#, akne*, mjehur*, poremećaj pigmentacije*   |
|                                       | Rijetko     | Kožna reakcija, Jessnerova limfocitna infiltracija, sindrom palmarno plantarne eritrodisestezije (sindrom šaka stopalo), potkožno krvarenje, Livedo reticularis, kožna induracija, papule, reakcija fotoosjetljivosti, seboreja, hladan znoj, nespecificirani kožni poremećaj, eritroza, kožni čirevi, poremećaj noktiju  |
| Poremećaji mišićno-koštanog sustava i | Vrlo često  | Mišićno-koštana bol*  |
|                                       | Često       | Mišićni spazmi*, bol u ekstremitetima, mišićna slabost  |

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| vezivnog tkiva                                | Manje često | Mišićni trzaji, oticanje zglobova, artritis*, ukočenost zglobova, miopatije*, osjećaj težine   |
|   | Rijetko     | Rabdomioliza, sindrom temporomandibularnog zgloba, fistula, izljev u zglobovima, bol u čeljusti, poremećaj kostiju, infekcije i upale mišićno koštanog sustava i vezivnog tkiva*, sinovijalna cista  |
| Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava        | Često       | Oštećenje bubrega *  |
|   | Manje često | Akutno zatajenje bubrega, kronično zatajenje bubrega*, infekcija mokraćnog sustava*, znakovi i simptomi mokraćnog sustava*, hematurija*, retencija mokraće, poremećaj mokrenja*, proteinurija, azotemija, oligurija*, polakizurija   |
|   | Rijetko     | Iritacija mjehura  |
| Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki     | Manje često | Vaginalno krvarenje, genitalna bol*, erektilna disfunkcija   |
|   | Rijetko     | Poremećaj testisa*, prostatitis, poremećaj dojki u žena, osjetljivost epididimisa, epididimitis, bol zdjelice, ulceracija na vulvi   |
| Prirođeni, obiteljski i genetski poremećaji   | Rijetko     | Aplazija, gastrointestinalne malformacije, ihtioza   |
| Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene | Vrlo često  | Pireksija*, umor, astenija   |
|   | Često       | Edemi (uključujući periferne), zimica, bol*, malaksalost*  |
|   | Manje često | Pogoršanje općeg fizičkog zdravlja*, edem lica*, reakcija na mjestu injiciranja*, poremećaj sluznice*, bol u prsištu, poremećaj hodanja, osjećaj hladnoće, ekstravazacija*, komplikacije povezane s kateterom*, promjene žedi*, nelagoda u prsištu, osjećaj promjene temperature tijela*, bol na mjestu injiciranja* |
|   | Rijetko     | Smrt (uključujući iznenadnu), multiorgansko zatajenje, krvarenje na mjestu injiciranja*, hernija (uključujući hijatus)*, poremećaj cijeljenja*, upala, flebitis na mjestu injiciranja*, osjetljivost, ulkus, iritabilnost, bol u prsištu ne-srčanog porijekla, bol na mjestu katetera, osjećaj stranog tijela        |
| Pretrage                                      | Često       | Smanjena težina  |
|   | Manje često | Hiperbilirubinemija*, abnormalan nalaz proteina*, povećana težina, abnormalan krvni nalaz*, povišen C-reaktivni protein  |
|   | Rijetko     | Abnormalni plinovi u krvi*, abnormalnosti elektrokardiograma (uključujući QT produljenje)*, abnormalan međunarodni normalizirani omjer (INR)*, snižen pH želuca, povećana agregacija trombocita, povišen troponin I, identifikacija virusa i serologija*, abnormalan nalaz urina*                                    |
| Ozljede, trovanja i proceduralne komplikacije | Manje često | Pad, kontuzija   |
|   | Rijetko     | Reakcije transfuzije, lomovi*, tresavica*, ozljeda lica, ozljeda zgloba*, opekline, laceracija, proceduralna bol, radijacijske ozljede*  |
| Operativni i medicinski postupci              | Rijetko     | Aktivacija makrofaga   |

\* Grupiranje više od jednog MedDRA preporučenog izraza.

# Nuspojave nakon stavljanja lijeka u promet neovisno o indikaciji

### *Limfom plaštenih stanica (MCL)*

Sigurnosni profil borteomiba u 240 bolesnika s MCL-om liječenih s 1,3 mg/m<sup>2</sup> borteomiba u kombinaciji s rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom (BR-CAP), naspram 242 bolesnika liječenih s rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom, vinkristinom i prednizonom [R-CHOP] bio je relativno sukladan onom zapaženom u bolesnika s multiplim mijelomom s glavnim

razlikama koje su opisane ispod. Dodatne identificirane nuspojave povezane s primjenom kombiniranog liječenja (BR-CAP) bile su infekcija hepatitisom B (< 1%) i ishemija miokarda (1,3%). Slične incidencije ovih događaja u obje skupine, ukazale su na to da se ove nuspojave ne mogu pripisati samom bortezomibu. Značajne razlike u populaciji bolesnika s limfomom plaštenih stanica kada se usporede s ispitivanjima s bolesnicima s multiplim mijelomom bile su  $\geq 5\%$  viša incidencija hematoloških nuspojava (neutropenija, trombocitopenija, leukopenija, anemija, limfopenija), periferna senzorna neuropatija, hipertenzija, pireksija, pneumonija, stomatitis i poremećaji dlakavosti.

Nuspojave identificirane poput onih s incidencijom  $\geq 1\%$ , slične ili veće incidencije u BR-CAP skupini s barem mogućom ili vjerojatnom uzročnom povezanošću s komponentama skupine BR-CAP, navedene su u Tablici 8 ispod. Također su uključene nuspojave identificirane u skupini BR-CAP za koje su ispitivači smatrali da imaju barem moguću ili vjerojatnu uzročnu povezanost s bortezomibom na temelju na povijesnih podataka u ispitivanjima multiplog mijeloma.

Nuspojave u daljnjem tekstu navedene su prema klasifikaciji organskih sustava i skupini učestalosti. Učestalost se definira kao: vrlo često ( $\geq 1/10$ ); često ( $\geq 1/100$  i  $< 1/10$ ); manje često ( $\geq 1/1000$  i  $< 1/100$ ); rijetko ( $\geq 1/10\ 000$  i  $< 1/1000$ ); vrlo rijetko ( $< 1/10\ 000$ ), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti. Tablice 8 bila je priređena na osnovu verzija 16 MedDRA-e.

Tablica 8: Nuspojave u bolesnika s limfomom plaštenih stanica liječenih s BR-CAP u kliničkom ispitivanju

| Klasifikacija organskih sustava   | Incidencija | Nuspojava   |
|-----------------------------------|-------------|---|
| Infekcije i infestacije           | Vrlo često  | Pneumonija*   |
|                                   | Često       | Sepsa (uključujući septički šok)*, herpes zoster (uključujući diseminirani i oftalmički), infekcija virusom herpesa*, bakterijske infekcije*, infekcija gornjih/donjih dišnih puteva*, gljivična infekcija*, herpes simpleks* |
|                                   | Manje često | Hepatitis B, infekcija*, bronhopneumonija   |
| Poremećaji krvi i limfnog sustava | Vrlo često  | Trombocitopenija*, febrilna neutropenija, neutropenija*, leukopenija*, anemija*, limfopenija*   |
|                                   | Manje često | Pancitopenija*  |
| Poremećaji imunološkog sustava    | Često       | Preosjetljivost*  |
|                                   | Manje često | Anafilaktička reakcija  |
| Poremećaji metabolizma i prehrane | Vrlo često  | Smanjeni apetit   |
|                                   | Često       | Hipokalijemija *, abnormalna vrijednost glukoze u krvi *, hiponatrijemija*, dijabetes melitus*, retencija tekućine  |
|                                   | Manje često | Sindrom lize tumora   |
| Psihijatrijski poremećaji         | Često       | Poremećaji i smetnje spavanja*  |
| Poremećaji živčanog sustava       | Vrlo često  | Periferna senzorna neuropatija, dizestezija*, neuralgija*   |
|                                   | Često       | Neuropatije*, motorna neuropatija*, gubitak svijesti (uključujući sinkopu), encefalopatija*, periferna senzorno-motorna neuropatija, omaglica*, disgeuzija*, autonomna neuropatija  |
|                                   | Manje često | Neravnoteža autonomnog živčanog sustava   |
| Poremećaji oka                    | Često       | Abnormalan vid*   |
| Poremećaji uha i labirinta        | Često       | Disakuzija (uključujući tinitus)*   |
|                                   | Manje često | Vertigo*, oštećenje sluha (do i uključujući gluhoću)  |
| Srčani poremećaji                 | Često       | Fibrilacija srca (uključujući atrijsku), aritmija*, srčano zatajenje (uključujući lijevo i desno ventrikularno)*, ishemija miokarda, ventrikularna disfunkcija*   |
|                                   | Manje često | Kardiovaskularni poremećaj (uključujući kardiogeni šok)   |
| Krvožilni poremećaji              | Često       | Hipertenzija*, hipotenzija*, ortostatska hipotenzija  |
| Poremećaji dišnog                 | Često       | Dispneja*, kašalj*, štucanje  |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| sustava, prsišta i sredoprsta                        | Manje često | Akutni respiratorni distres sindrom, plućna embolija, pneumonitis, plućna hipertenzija, plućni edem (uključujući akutni)   |
| Poremećaji probavnog sustava                         | Vrlo često  | Mučnina i simptomi povraćanja*, proljev *, stomatitis*, konstipacija   |
|  | Često       | Gastrointestinalno krvarenje (uključujući mukozno)*, distenzija abdomena, dispepsija, orofaringealna bol *, gastritis*, ulceracije u ustima*, nelagoda u abdomenu, disfagija, gastrointestinalna upala*, bol u abdomenu (uključujući gastrointestinalnu bol i bol slezene)*, poremećaj u ustima* |
|  | Manje često | Kolitis (uključujući <i>Clostridium difficile</i> )*   |
| Poremećaji jetre i žuči                              | Često       | Hepatotoksičnost (uključujući poremećaj jetre)   |
|  | Manje često | Zatajenje jetre  |
| Poremećaji kože i potkožnog tkiva                    | Vrlo često  | Poremećaj dlakavosti*  |
|  | Često       | Pruritus*, dermatitis*, osip*  |
| Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva | Često       | Mišićni spazmi*, mišićno-koštana bol*, bol u ekstremitetima  |
| Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava               | Često       | infekcija mokraćnog sustava*   |
| Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene        | Vrlo često  | Pireksija*, umor, astenija   |
|  | Često       | Edem (uključujući periferni), zimica, reakcija na mjestu injekcije*, malaksalost*  |
| Pretrage   | Često       | Hiperbilirubinemija*, abnormalan nalaz analize proteina*, smanjena težina, povećana težina   |

\* Grupiranje više od jednog MedDRA preporučenog izraza.

### Opis odabranih nuspojava

#### *Reaktivacija virusa herpes zoster*

##### Multipli mijelom

Antivirusna profilaksa se primijenila u 26% bolesnika u skupini koja je primala B+M+P. Incidencija herpes zosteru u skupini bolesnika koja je primala B+M+P bila je 17% u onih kojima se nije primijenila antivirusna profilaksa, u usporedbi s 3% bolesnika kojima se primijenila antivirusna profilaksa.

##### Limfom plaštenih stanica

Antivirusna profilaksa bila je primijenjena u 137 od 240 bolesnika (57%) u BR-CAP skupini. Incidencija herpes zosteru među bolesnicima u BR-CAP skupini bila je 10,7% za bolesnike kojima nije bila primijenjena antivirusna profilaksa u usporedbi s 3,6% za bolesnike kojima je primijenjena antivirusna profilaksa (vidjeti dio 4.4).

#### *Reaktivacija virusa hepatitisa B (HBV) i infekcija*

##### Limfom plaštenih stanica

Infekcija HBV-om sa smrtonosnim ishodom pojavila se kod 0,8% (n=2) bolesnika u skupini koja nije liječena borteomibom (rituksimab, ciklofosamid, doksorubicin, vinkristin i prednizon; R-CHOP) i u 0,4% (n=1) bolesnika koji su primali borteomib u kombinaciji s rituksimabom, ciklofosamidom, doksorubicinom i prednizonom (BR-CAP). Ukupna incidencija infekcija hepatitisom B bila je slična u bolesnika liječenih s BR-CAP i liječenih s R-CHOP (0,8% odnosno 1,2%).

#### *Periferna neuropatija u kombiniranim režimima*

##### Multipli mijelom

U ispitivanjima u kojima je borteomib bio primijenjen kao uvodno liječenje u kombinaciji s deksametazonom (ispitivanje IFM-2005-01), i deksametazonom-talidomidom (ispitivanje MMY-3010), incidencija periferne neuropatije u kombiniranim režimima prikazana je u tablici dolje:



Tablica 9: Incidencija periferne neuropatije tijekom uvodnog liječenja u odnosu na toksičnost i prekid liječenja radi periferne neuropatije

|                    | IFM-2005-01     |                | MMY-3010       |                 |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                    | VDDx<br>(N=239) | BDx<br>(N=239) | TDx<br>(N=126) | BTDx<br>(N=130) |
| Incidencija PN (%) |                 |                |                |                 |
| Svi stupnjevi PN   | 3               | 15             | 12             | 45              |
| ≥ Stupanj 2 PN     | 1               | 10             | 2              | 31              |
| ≥ Stupanj 3 PN     | <1              | 5              | 0              | 5               |
| Prekid zbog PN (%) | <1              | 2              | 1              | 5               |

VDDx=vinkristin, doksorubicin, deksametazon; BDx=bortezomib, deksametazon; TDx=talidomid, deksametazon;

BTDx=bortezomib, talidomid, deksametazon; PN=periferna neuropatija

Napomena: Periferna neuropatija je uključila preferirane termine: periferna neuropatija, periferna motorna neuropatija, periferna senzorna neuropatija i polineuropatija.

#### Limfom plaštenih stanica

U ispitivanju LYM-3002 u kojem je bortezomib primijenjen s rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom (R-CAP), incidencija periferne neuropatije u kombiniranim režimima prikazana je u tablici ispod:

Tablica 10: Incidencija periferne neuropatije u ispitivanju LYM-3002 prema toksičnosti i prekidu liječenja radi periferne neuropatije

|                    | BR-CAP<br>(N=240) | R-CHOP<br>(N=242) |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Incidencija PN (%) |                   |                   |
| Svi stupnjevi PN   | 30                | 29                |
| ≥ Stupanj 2 PN     | 18                | 9                 |
| ≥ Stupanj 3 PN     | 8                 | 4                 |
| Prekid zbog PN (%) | 2                 | < 1               |

BR-CAP=bortezomib, rituksimab, ciklofosfamid, doksorubicin i prednizon; R-CHOP= rituksimab, ciklofosfamid, doksorubicin, vinkristin i prednizon; PN=periferna neuropatija

Periferna neuropatija uključila je preporučene izraze: periferna senzorna neuropatija, periferna neuropatija, periferna motorna neuropatija i periferna senzorno-motorna neuropatija

#### Stariji bolesnici s MCL-om

42,9% i 10,4% bolesnika u BR-CAP skupini bilo je u dobi unutar raspona 65-74 godina odnosno ≥ 75 godina starosti. Iako su bolesnici u dobi od ≥ 75 godina, podnosili lošije i BR-CAP i R-CHOP, stopa ozbiljnih nuspojava u BR-CAP skupini bila je 68%, u usporedbi s 42% u R-CHOP skupini.

#### Primjetne razlike sigurnosnog profila bortezomiba primijenjenog kao monoterapija supkutano u odnosu na intravensku primjenu

U ispitivanju faze III bolesnici koji su primili bortezomib supkutano u odnosu na intravensku primjenu, ukupno su imali 13% manju incidenciju nuspojava stupnja toksičnosti 3 ili više, koje su proizašle iz liječenja i 5% manju incidenciju prekida primjene bortezomiba. Ukupna incidencija proljeva, gastrointestinalne i abdominalne boli, astenijskih stanja, infekcija gornjih dišnih putova i perifernih neuropatija, bila je 12%-15% niža u skupini supkutane primjene nego u intravenskoj skupini. Dodatno, incidencija perifernih neuropatija stupnja 3 ili više bila je 10% niža, a stopa prekida primjene zbog perifernih neuropatija bila je 8% niža za supkutanu skupinu u usporedbi s intravenskom skupinom.

Šest posto bolesnika imalo je nuspojave na mjestu supkutane primjene, uglavnom crvenilo. Medijan od 6 dana bio je potreban za prolazak nuspojave, a kod dvoje bolesnika bila je potrebna promjena doze.



Dvoje (1%) bolesnika imalo je teške reakcije; 1 slučaj pruritusa i 1 slučaj crvenila.

Incidencija smrti za vrijeme liječenja bila je 5% u skupini liječenoj supkutano, a 7% u skupini liječenoj intravenski. Incidencija smrti od "Progresije bolesti" bila je 18% u supkutanoj skupini i 9% u intravenskoj skupini.

#### *Ponavljanje liječenja u bolesnika s relapsom multiplog mijeloma*

U ispitivanju u kojem se liječenje bortezomibom primijenilo ponovno kod 130 bolesnika s relapsom multiplog mijeloma, koji su prethodno imali barem parcijalni odgovor na režim liječenja koji je uključivao bortezomib, najčešće nuspojave svih stupnjeva, koje su se pojavile u barem 25% bolesnika bile su trombocitopenija (55%), neuropatija (40%), anemija (37%), proljev (35%) i konstipacija (28%). Periferna neuropatija svih stupnjeva i periferna neuropatija stupnja  $\geq 3$  bile su uočene u 40% odnosno 8,5% bolesnika.

#### Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava **navedenog u Dodatku V.**

## **4.9 Predoziranje**

U bolesnika je predoziranje dozom koja je više od dvostruko veća od preporučene bilo povezano s akutnim početkom simptomatske hipotenzije i trombocitopenije sa smrtnim ishodom. Za neklinička ispitivanja kardiovaskularne sigurnosne farmakologije, vidjeti dio 5.3.

Specifičan antidot kod predoziranja bortezomibom nije poznata. U slučaju predoziranja potrebno je pratiti vitalne znakove bolesnika te im pružiti odgovarajuće potporne mjere za održavanje krvnog tlaka (kao što je tekućina, presorni lijekovi i/ili inotropni lijekovi) i tjelesne temperature (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4).

## **5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA**

### **5.1 Farmakodinamička svojstva**

Farmakoterapijska skupina: Antineoplastični lijekovi, ostali antineoplastici, ATK oznaka: L01XX32.

#### Mehanizam djelovanja

Bortezomib je inhibitor proteasoma. On je posebno oblikovan da inhibira aktivnost poput kimotripsina 26S proteasoma u stanicama sisavaca. 26S proteasom je veliki proteinski kompleks koji razgrađuje ubikvitinirane proteine. Put ubikvitin - proteasom igra ključnu ulogu u regulaciji prometa specifičnih proteina i tako održava homeostazu unutar stanica. Inhibicijom 26S proteasoma sprječava se ova ciljana proteoliza i utječe na višestruku kaskadu signala unutar stanica, što naposljetku rezultira smrću stanica raka.

Bortezomib je visoko selektivan za proteasome. U koncentraciji od 10  $\mu\text{M}$ , bortezomib ne inhibira niti jedan od probраних raznih receptora i proteaza i pokazuje više nego 1500 puta veću selektivnost prema proteasomima nego sljedećem enzimu prema kojem ima afinitet. Kinetika inhibicije proteasoma ocjenjivala se *in vitro* i pokazalo se da se bortezomib razdvaja od proteasoma uz  $t_{1/2}$  od 20 minuta, pokazujući tako da je inhibicija proteasoma bortezomibom reverzibilna.

Bortezomibom posredovana inhibicija proteasoma utječe na stanice raka na više načina, uključujući između ostaloga, iako to nije jedini način, i promjenu regulacijskih proteina koji kontroliraju odvijanje staničnog ciklusa i aktivaciju nuklearnog faktora kappa B (NF- $\kappa$ B). Inhibicija proteasoma rezultira zastojem staničnog ciklusa i apoptozom. NF- $\kappa$ B je transkripcijski čimbenik čija je aktivacija potrebna za mnoge aspekte tumorigeneze, uključujući rast i preživljenje stanica, angiogenezu, interakcije između

stanica i metastaze. Kod mijeloma, bortezomib utječe na sposobnost interakcije stanica mijeloma s mikrookolišem koštane srži.

Pokusi su pokazali da je bortezomib citotoksičan za razne vrste stanica raka i da su stanice raka osjetljivije od normalnih stanica na proapoptotičke učinke inhibicije proteasoma. Bortezomib smanjuje rast tumora *in vivo* u mnogim nekliničkim modelima tumora, uključujući multipli mijelom.

Podaci ispitivanja *in vitro*, *ex-vivo* i na životinjskim modelima pokazuju da bortezomib povećava diferencijaciju i aktivnost osteoblasta i inhibira funkciju osteoklasta. Ovi su učinci bili primijećeni u bolesnika s multiplim mijelomom koji su imali uznapredovalu osteolitičku bolest i liječili su se bortezomibom.

#### Klinička djelotvornost u prethodno neliječenih bolesnika s multiplim mijelomom

Prospektivno, međunarodno, randomizirano (1:1) kliničko ispitivanje faze III otvorenog tipa (MMY-3002 VISTA) koje je uključilo 682 bolesnika, provedeno je da bi se utvrdilo hoće li bortezomib (1,3 mg/m<sup>2</sup> primijenjen intravenskom injekcijom) u kombinaciji s melfalanom (9 mg/m<sup>2</sup>) i prednizonom (60 mg/m<sup>2</sup>) rezultirati boljim vremenom do progresije bolesti (TTP od engl. *time to progression*) u usporedbi s melfalanom (9 mg/m<sup>2</sup>) i prednizonom (60 mg/m<sup>2</sup>) u prethodno neliječenih bolesnika s multiplim mijelomom. Liječenje se primjenjivalo tijekom najviše 9 ciklusa (približno 54 tjedna) i prekinuto je u početnoj fazi zbog progresije bolesti ili neprihvatljive toksičnosti. Medijan dobi bolesnika u ispitivanju bio je 71 godina, 50% bili su muškarci, 88% bili su bijele rase a medijan rezultata funkcionalnog stanja po Karnofskom za bolesnike je bio 80. Bolesnici su imali mijelom IgG/IgA/lakih lanaca u 63%/25%/8% slučajeva, medijan hemoglobina od 105 g/l, i medijan broja trombocita od 221,5 x 10<sup>9</sup>/l. Slični udjeli bolesnika imali su klirens kreatinina ≤ 30 ml/min (3% u svakoj skupini).

U vrijeme unaprijed planirane privremene analize postigla se primarna mjera ishoda, vrijeme do progresije te je bolesnicima u M+P kraku studije bilo ponuđeno liječenje B+M+P. Medijan praćenja iznosio je 16,3 mjeseci. Finalno ažuriranje podataka o preživljenju napravilo se uz medijan praćenja od 60,1 mjeseci. Primijećeno je statistički značajno veće preživljenje u skupini liječenoj s B+M+P (HR=0,695; p=0,00043) usprkos naknadnim terapijama koje uključuju liječenje bortezomibom. Medijan preživljenja za skupinu koja je primala B+M+P bio je 56,4 mjeseci u odnosu na 43,1 za skupinu koja je primala M+P. Rezultati djelotvornosti prikazani su u Tablici 11:

Tablica 11: Rezultati djelotvornosti nakon finalnog ažuriranja podataka o preživljenju u ispitivanju VISTA

| Ishod djelotvornosti                       | B+M+P<br>n=344               | M+P<br>n=338                 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>Vrijeme do progresije</b>               |                              |                              |
| dogadjaji n (%)                            | 101 (29)                     | 152 (45)                     |
| Medijan <sup>a</sup> (95% CI)              | 20,7 mjeseci<br>(17,6, 24,7) | 15,0 mjeseci<br>(14,1, 17,9) |
| Omjer hazarda <sup>b</sup><br>(95% CI)     | 0,54<br>(0,42, 0,70)         |                              |
| p-vrijednost <sup>c</sup>                  | 0,000002                     |                              |
| <b>Preživljenje bez progresije bolesti</b> |                              |                              |
| dogadjaji n (%)                            | 135 (39)                     | 190 (56)                     |
| Medijan <sup>a</sup> (95% CI)              | 18,3 mjeseca<br>(16,6, 21,7) | 14,0 mjeseci<br>(11,1, 15,0) |
| Omjer hazarda <sup>b</sup><br>(95% CI)     | 0,61<br>(0,49, 0,76)         |                              |
| p-vrijednost <sup>c</sup>                  | 0,00001                      |                              |
| <b>Ukupno preživljenje*</b>                |                              |                              |
| dogadjaji (smrti) n (%)                    | 176 (51,2)                   | 211 (62,4)                   |
| Medijan <sup>a</sup><br>(95% CI)           | 56,4 mjeseca<br>(52,8; 60,9) | 43,1 mjesec<br>(35,3; 48,3)  |
| Omjer hazarda <sup>b</sup><br>(95% CI)     | 0,695<br>(0,567; 0,852)      |                              |

|  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| p-vrijednost <sup>c</sup>  | 0,00043                      |                              |
| <b>Stopa odgovora</b><br>populacija <sup>e</sup> n = 668               | n=337                        | n=331                        |
| CR <sup>f</sup> n (%)  | 102 (30)                     | 12 (4)                       |
| PR <sup>f</sup> n (%)  | 136 (40)                     | 103 (31)                     |
| nCR n (%)  | 5 (1)                        | 0                            |
| CR+PR <sup>f</sup> n (%)   | 238 (71)                     | 115 (35)                     |
| p-vrijednost <sup>d</sup>  | < 10 <sup>-10</sup>          |                              |
| <b>Smanjenje serumskog M proteina</b><br>populacija <sup>g</sup> n=667 | n=336                        | n=331                        |
| ≥90% n (%)   | 151 (45)                     | 34 (10)                      |
| <b>Vrijeme do prvog odgovora u CR + PR</b>                             |                              |                              |
| Medijan  | 1,4 mjeseca                  | 4,2 mjeseca                  |
| <b>Medijan<sup>a</sup> trajanja odgovora</b>                           |                              |                              |
| CR <sup>f</sup>  | 24,0 mjeseca                 | 12,8 mjeseci                 |
| CR+PR <sup>f</sup>   | 19,9 mjeseci                 | 13,1 mjesec                  |
| <b>Vrijeme do sljedeće terapije</b><br>dogadaji n (%)                  | 224 (61,5)                   | 260 (76,9)                   |
| Medijan <sup>a</sup><br>(95% CI)                                       | 27,0 mjeseci<br>(24,7; 31,1) | 19,2 mjeseci<br>(17,0; 21,0) |
| Omjer hazarda <sup>b</sup><br>(95% CI)                                 | 0,557<br>(0,462; 0,671)      |                              |
| p-vrijednost   | < 0,000001                   |                              |

<sup>a</sup> Kaplan-Meierova analiza.

<sup>b</sup> Procjena omjera hazarda (HR) temelji se na Coxovom modelu proporcionalnog rizika prilagođenom prema čimbenicima stratifikacije: β<sub>2</sub>--mikroglobulinu, albuminu i regiji. Omjer hazarda manji od 1 pokazuje da VMP ima prednost.

<sup>c</sup> Nominalna p-vrijednost utemeljena na stratificiranom log-rank testu prilagođenom za čimbenike stratifikacije: β<sub>2</sub>--mikroglobulina, albumina i regije.

<sup>d</sup> p-vrijednost za stopu odgovora (CR+PR) iz Cochran Mantel-Haenszelovog hi-kvadrat testa prilagođenog za čimbenike stratifikacije.

<sup>e</sup> Populacija s odgovorom uključuje bolesnike koji imaju mjerljivu bolest na početku ispitivanja.

<sup>f</sup> CR=Kompletni odgovor; PR=Parcijalni odgovor. EBMT kriteriji

<sup>g</sup> Svi randomizirani bolesnici sa sekrecijskom bolešću.

\* Ažurirano preživljenje na temelju medijana trajanja praćenja od 60,1 mjesec

CI=Interval pouzdanosti

### *Bolesnici kod kojih je transplantacija matičnih stanica prikladna*

Dva randomizirana, otvorena, multicentrična ispitivanja faze III (IFM-2005-01, MMY-3010) bila su provedena radi utvrđivanja sigurnosti i djelotvornosti bortezomiba u dvostrukoj ili trostrukoj kombinaciji s drugim kemoterapeutičkim, kao uvodno liječenje prije transplantacije matičnih stanica u bolesnika s prethodno neliječenim multiplim mijelomom.

U ispitivanju IFM-2005-01 bortezomib u kombinaciji s deksametazonom [BDx, n=240] bio je uspoređen s vinkristinom-doksorubicinom-deksametazonom [VDDx, n=242]. Bolesnici u BDx skupini primili su četiri 21 dnevna ciklusa, od kojih je svaki uključivao bortezomib (1,3 mg/m<sup>2</sup> primijenjen intravenski dva puta na tjedan 1., 4., 8. i 11. dana), i oralni deksametazon (40 mg/dan od 1. do 4. i 9. do 12. dana, u 1. i 2. ciklusu, te 1. do 4. dan u 3. i 4. ciklusu).

Autologne transplantate matičnih stanica primilo je 198 (82%) bolesnika odnosno 208 (87%) bolesnika u VDDx i BDx skupinama; većina bolesnika prošla je jednu transplantaciju. Demografske karakteristike bolesnika, te osnovne karakteristike bolesti bile su slične među liječenim skupinama. Medijan dobi bolesnika u ispitivanju bio je 57 godina, 55% bili su muškarci i 48% bolesnika imalo je citogenetiku visokog rizika. Medijan trajanja liječenja bio je 13 tjedana za skupinu VDDx i 11 tjedana za BDx skupinu. Medijan broja ciklusa koje su primile obje skupine bio je 4 ciklusa.

Primarni ishod djelotvornosti ispitivanja bio je post-indukcijska stopa odgovora (CR+nCR). Statistički značajna razlika CR+nCR bila je uočena u korist skupine koja je primala bortezomib u kombinaciji s deksametazonom. Sekundarni ishod djelotvornosti uključio je posttransplantacijske stope odgovora (CR+nCR, CR+nCR+VGPR+PR), preživljenje bez progresije i ukupno preživljenje. Glavni rezultati djelotvornosti prikazani su u Tablici 12.

Tablica 12: Rezultati djelotvornosti iz ispitivanja IFM-2005-01

| Mjere ishoda                            | BDx               | VDDx                   | OR; 95% CI; P-             |
|---|-------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>IFM-2005-01</b>                      | N=240 (ITT        | N=242 (ITT populacija) |                            |
| RR (Postindukcijska)                    | 14,6 (10,4, 19,7) | 6,2 (3,5, 10,0)        | 2,58 (1,37, 4,85);         |
| *CR+nCR                                 | 77,1 (71,2, 82,2) | 60,7 (54,3, 66,9)      | 0,003                      |
| CR+nCR+VGPR+PR % (95% CI)               |                   |                        | 2,18 (1,46, 3,24); < 0,001 |
| RR (Posttransplantacijska) <sup>b</sup> | 37,5 (31,4, 44,0) | 23,1 (18,0, 29,0)      | 1,98 (1,33, 2,95);         |
| CR+nCR                                  | 79,6 (73,9, 84,5) | 74,4 (68,4, 79,8)      | 0,001                      |
| CR+nCR+VGPR+PR % (95% CI)               |                   |                        | 1,34 (0,87, 2,05); 0,179   |

CI= interval pouzdanosti; CR=kompletni odgovor; nCR=blizu kompletnog odgovora; ITT=Populacija bolesnika s namjerom liječenja; RR=stopa odgovora; B=bortezomib; BDx=bortezomib, deksametazon; VDDx=vinkristin, doksorubicin, deksametazon; VGPR=vrlo dobar parcijalni odgovor; PR=parcijalni odgovor; OR=omjer izgleda.

\* Primarni ishod

<sup>a</sup> OR za stope odgovora temeljeno na Mantel-Haenszelovoj procjeni zajedničkog omjera izgleda za stratificirane tablice; p-vrijednosti Cochran Mantel-Haenszelovog testa.

<sup>b</sup> odnosi se na stope odgovora nakon druge transplantacije za ispitanike koji su prošli drugu transplantaciju (42/240 [18%] u BDx skupini i 52/242 [21%] u VDDx skupini).

Napomena: OR > 1 ukazuje na prednost za uvodno liječenje koje sadrži B.

U ispitivanju MMY-3010 uvodno liječenje bortezomibom u kombinaciji s talidomidom i deksametazonom [BTDx, n=130] bilo je uspoređeno s liječenjem talidomidom-deksametazonom [TDx, n=127]. Bolesnici u BTDx skupini primili su šest 4-tjedna ciklusa, od kojih je svaki uključivao bortezomib (1,3 mg/m<sup>2</sup> primijenjen dva puta na tjedan 1., 4., 8. i 11. dan, nakon čega je uslijedio 17-dnevni period odmora od 12. do 28. dana), deksametazon (40 mg primijenjeno oralno 1. do 4. i 8. do 11. dan), i talidomid (primijenjen oralno 50 mg na dan 1.-14. dan, doza povišena na 100 mg 15.-28. dana a nakon toga na 200 mg na dan).

Jednu autolognu transplantaciju matičnih stanica primilo je 105 (81%) bolesnika odnosno 78 (61%) bolesnika u BTDx i TDx skupini. Demografske karakteristike bolesnika, te osnovne karakteristike bolesti bile su slične među liječenim skupinama. Medijan dobi bolesnika u BTDx odnosno TDx skupini, bio je 57 naspram 56 godina, 99% naspram 98% bolesnika bili su bijele rase, a 58% naspram 54% bili su muškarci. U BTDx skupini 12% bolesnika bili su citogenetički svrstani u skupinu visokog rizika naspram 16% bolesnika u TDx skupini. Medijan trajanja liječenja bio je 24,0 tjedna, i medijan broja primljenih ciklusa liječenja bio je 6,0, te je bio dosljedan unutar liječenih skupina.

Primarne mjere ishoda ispitivanja bile su postindukcijske i posttransplantacijske stope odgovora (CR+nCR). Statistički značajna razlika CR+nCR bila je uočena u korist skupine s bortezomibom u kombinaciji s deksametazonom i talidomidom. Sekundarne mjere ishoda uključile su preživljenje bez progresije i ukupno preživljenje. Glavni rezultati djelotvornosti prikazani su u Tablici 13.

Tablica 13: Rezultati djelotvornosti iz ispitivanja MMY-3010

| Mjere ishoda                | BTDx                   | TDx                    | OR; 95% CI; P vrijednost <sup>a</sup>   |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|
| <b>MMY-3010</b>             | N=130 (ITT populacija) | N=127 (ITT populacija) |   |
| *RR (Postindukcijska)       |                        |                        |   |
| CR+nCR                      | 49,2 (40,4, 58,1)      | 17,3 (11,2, 25,0)      | 4,63 (2,61, 8,22); < 0,001 <sup>a</sup> |
| CR+nCR+PR % (95% CI)        | 84,6 (77,2, 90,3)      | 61,4 (52,4, 69,9)      | 3,46 (1,90, 6,27); < 0,001 <sup>a</sup> |
| *RR (Posttransplantacijska) |                        |                        |   |
| CR+nCR                      | 55,4 (46,4, 64,1)      | 34,6 (26,4, 43,6)      | 2,34 (1,42, 3,87); 0,001 <sup>a</sup>   |
| CR+nCR+PR % (95% CI)        | 77,7 (69,6, 84,5)      | 56,7 (47,6, 65,5)      | 2,66 (1,55, 4,57); < 0,001 <sup>a</sup> |

CI= interval pouzdanosti; CR=kompletni odgovor; nCR=blizu kompletnog odgovora; ITT=populacija bolesnika uključenih u ispitivanje; RR=stopa odgovora; B=bortezomib; BTDx=bortezomib, talidomid, deksametazon; TDx=talidomid, deksametazon; PR=parcijalni odgovor; OR=omjer izgleda;

\* Primarna mjera ishoda

<sup>a</sup> OR za stope odgovora temeljeno na Mantel Haenszelovoj procjeni zajedničkog omjera izgleda za stratificirane tablice; p-vrijednosti Cochran Mantel Haenszelovog testa.

Napomena: OR > 1 ukazuje na prednost za uvodno liječenje koje sadrži B

### Klinička djelotvornost kod relapsa ili refraktornog multiplog mijeloma

Sigurnost i djelotvornost primjene bortezomiba (primijenjenog intravenskom injekcijom) u preporučenoj dozi od 1,3 mg/m<sup>2</sup> procjenjivale su se u 2 ispitivanja: randomiziranom, komparativnom ispitivanju faze III (APEX), u usporedbi s deksametazonom (Dex) u 669 bolesnika s relapsom ili refraktornim multiplim mijelomom koji su prethodno bili primili 1-3 linije terapije te ispitivanju faze II u jednoj skupini od 202 bolesnika s relapsom i refraktornim multiplim mijelomom, koji su prethodno primili najmanje 2 linije terapije i u kojih je bolest napredovala za vrijeme posljednje terapije.

U ispitivanju faze III, liječenje bortezomibom značajno je produljilo vrijeme do progresije bolesti i dovelo do značajno produljenog preživljenja te značajno veće stope odgovora u usporedbi s liječenjem deksametazonom (vidjeti tablicu 14) u svih bolesnika, kao i u bolesnika koji su prethodno primili 1 liniju terapije. Kao posljedica unaprijed planirane privremene analize, skupini koja je primala deksametazon liječenje je zaustavljeno na preporuku radne skupine koja je pratila ispitivanja i svim je bolesnicima nakon toga ponuđeno liječenje bortezomibom bez obzira na stanje bolesti. Zbog ovog ranog prelaska na drugi lijek, medijan trajanja praćenja preživjelih bolesnika bio je 8,3 mjeseca. I u bolesnika koji su bili refraktorni na zadnje prethodno liječenje i onih koji nisu bili refraktorni, ukupno preživljenje bilo je značajno dulje i stopa odgovora bila je značajno viša u skupini koja je primala bortezomib.

Od 669 uključenih bolesnika, 245 (37%) bilo je u dobi od 65 godina ili starije. Parametri odgovora kao i TTP ostali su značajno bolji u skupini koja je primala bortezomib neovisno o dobi. Bez obzira na razine  $\beta_2$ -mikroglobulina na početku ispitivanja, svi parametri djelotvornosti (vrijeme do progresije i ukupno preživljenje, kao i stopa odgovora) bili su značajno bolji u skupini koja je primala bortezomib.

U populaciji s refraktornom bolešću u ispitivanju faze II, odgovore na liječenje je utvrdilo neovisno ocjenjivačko povjerenstvo, a odgovor se procjenjivao prema kriterijima Europske skupine za presađivanje koštane srži. Medijan preživljenja svih uključenih bolesnika bio je 17 mjeseci (raspon <1 do 36+ mjeseci). Ovo je preživljenje bilo veće od medijana preživljenja od šest do devet mjeseci koje su očekivali ispitivači savjetnici kod populacije sličnih bolesnika. Prema multivarijantnoj analizi, stopa odgovora nije ovisila o vrsti mijeloma, funkcionalnom stanju, deleciji kromosoma 13 ili broju i vrsti prethodnih liječenja. Bolesnici koji su prethodno primili 2 do 3 terapijske sheme imali su stopu odgovora od 32% (10/32), a bolesnici koji su prethodno primili više od 7 terapijskih shema imali su stopu odgovora od 31% (21/67).

Tablica 14: Sažetak ishoda bolesti u ispitivanjima faze III (APEX) i faze II

|                                      | Faza III                    |                            | Faza III                      |                             | Faza III                        |                           | Faza II                 |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                      | Svi bolesnici               |                            | 1 linija prethodnog liječenja |                             | > 1 linije prethodnog liječenja |                           | ≥ 2 prethodne linije    |
| Odnos događaja i vremena             | B<br>n=333 <sup>a</sup>     | Dex<br>n=336 <sup>a</sup>  | B<br>n=132 <sup>a</sup>       | Dex<br>n=119 <sup>a</sup>   | B<br>n=200 <sup>a</sup>         | Dex<br>n=217 <sup>a</sup> | B<br>n=202 <sup>a</sup> |
| TTP, dani<br>[95% CI]                | 189 <sup>b</sup> [148, 211] | 106 <sup>b</sup> [86, 128] | 212 <sup>d</sup> [188, 267]   | 169 <sup>d</sup> [105, 191] | 148 <sup>b</sup> [129, 192]     | 87 <sup>b</sup> [84, 107] | 210 [154, 281]          |
| 1 godina preživljenja, %<br>[95% CI] | 80 <sup>d</sup> [74,85]     | 66 <sup>d</sup> [59,72]    | 89 <sup>d</sup> [82,95]       | 72 <sup>d</sup> [62,83]     | 73 [64,82]                      | 62 [53,71]                | 60                      |
| Najbolji odgovor (%)                 | B<br>n=315 <sup>c</sup>     | Dex<br>n=312 <sup>c</sup>  | B<br>n=128                    | Dex<br>n=110                | B<br>n=187                      | Dex<br>n=202              | B<br>n=193              |
| CR                                   | 20 (6) <sup>b</sup>         | 2 (< 1) <sup>b</sup>       | 8 (6)                         | 2 (2)                       | 12 (6)                          | 0 (0)                     | (4)**                   |
| CR+nCR                               | 41 (13) <sup>b</sup>        | 5 (2) <sup>b</sup>         | 16 (13)                       | 4 (4)                       | 25 (13)                         | 1 (< 1)                   | (10)**                  |
| CR+nCR+PR                            | 121 (38) <sup>b</sup>       | 56 (18) <sup>b</sup>       | 57 (45) <sup>d</sup>          | 29 (26) <sup>d</sup>        | 64 (34) <sup>b</sup>            | 27 (13) <sup>b</sup>      | (27)**                  |
| CR+nCR+PR+MR                         | 146 (46)                    | 108 (35)                   | 66 (52)                       | 45 (41)                     | 80 (43)                         | 63 (31)                   | (35)**                  |
| Medijan trajanja                     | 242 (8,0)                   | 169 (5,6)                  | 246 (8,1)                     | 189 (6,2)                   | 238 (7,8)                       | 126 (4,1)                 | 385*                    |



|   |    |    |    |    |    |    |     |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|
| dani (mjeseci)                          |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>Vrijeme do odgovora CR+PR (dani)</b> | 43 | 43 | 44 | 46 | 41 | 27 | 38* |

<sup>a</sup> Populacija bolesnika s namjerom liječenja (ITT od eng. Intent to treat).

<sup>b</sup> p-vrijednost iz stratificiranog log-rank testa; analiza po liniji liječenja isključuje stratifikaciju po prethodnim liječenjima; p < 0,0001

<sup>c</sup> Populacija s terapijskim odgovorom uključuje bolesnike koji su imali mjerljivu bolest na početku liječenja i primili su najmanje 1 dozu ispitivanog lijeka.

<sup>d</sup> p-vrijednost iz Cochran Mantel-Haenszelovog hi-kvadrat testa prilagođena za čimbenike stratifikacije; analiza po liniji terapije isključuje stratifikaciju po prethodnim liječenjima

\* CR+PR+MR \*\*CR=CR, (IF-); nCR=CR (IF+)

TTP-Vrijeme do progresije bolesti

CI=Interval pouzdanosti

B=bortezomib; Dex=deksametazon

CR=Kompletni odgovor; nCR=blizu kompletnog odgovora

PR=Parcijalni odgovor; MR=Minimalni odgovor

U ispitivanju faze II, bolesnici koji nisu postigli optimalni terapijski odgovor kod liječenja samo bortezomibom mogli su primiti visoku dozu deksametazona zajedno s bortezomibom. Prema planu ispitivanja, bolesnici su mogli primiti deksametazon ako je njihov odgovor na liječenje samo bortezomibom bio slabiji od optimalnog. Ukupno je 74 bolesnika, koje se moglo procijeniti, primilo deksametazon u kombinaciji s bortezomibom. Osamnaest posto bolesnika postiglo je ili je imalo poboljšan odgovor [MR (11%) ili PR (7%)] uz kombinirano liječenje.

#### *Klinička djelotvornost uz supkutanu primjenu bortezomiba u bolesnika s relapsnim/refraktornim multiplim mijelomom*

U otvorenom, randomiziranom ispitivanju neinferiornosti, faze III uspoređena je djelotvornost i sigurnost supkutane primjene bortezomiba, u odnosu na intravensku primjenu. U ispitivanje su uključena 222 bolesnika s relapsnim/refraktornim multiplim mijelomom, koji su bili randomizirani u omjeru 2:1, kako bi primili bortezomib 1,3 mg/m<sup>2</sup> bilo supkutano ili intravenski u 8 ciklusa.

Bolesnicima koji nisu dostigli optimalni odgovor (manje od potpunog terapijskog odgovora [CR, od engl. *Complete Response*]) na liječenje samo bortezomibom, nakon 4 ciklusa, bilo je dozvoljeno primanje 20 mg deksametazona dnevno, na dan primjene i dan poslije primjene bortezomiba. Bolesnici s osnovnom perifrenom neuropatijom stupnja ≥ 2 ili s brojem trombocita < 50 000/μl bili su isključeni. U ukupno 218 bolesnika bila je moguća procjena odgovora.

Ovo ispitivanje doseglo je svoj primarni cilj, neinferiornost u stopi odgovora (CR+PR) nakon 4 ciklusa samostalno primijenjenog bortezomiba za oba puta primjene, i supkutano i intravenski, 42% u obje skupine. Dodatno, ishodi djelotvornosti povezani sa sekundarnim odgovorom i vremenom do događaja pokazali su dosljedne rezultate za supkutano i intravensku primjenu (tablica 15).

*Tablica 15: Sažetak analize djelotvornosti usporedbe supkutane i intravenske primjene bortezomiba*

|  | <b>Skupina intravenski primijenjenog bortezomiba</b> | <b>Skupina supkutano primijenjenog bortezomiba</b> |
|--|--|--|
| <b>Populacija procjenjiva na odgovor</b> | <b>n=73</b>  | <b>n=145</b>                                       |
| <b>Stopa odgovora u 4 ciklusa n (%)</b>  |  |  |
| ORR (CR+PR)                              | 31 (42)  | 61 (42)  |
| p-vrijednost <sup>a</sup>                |  | 0,00201  |
| CR n (%)                                 | 6 (8)  | 9 (6)  |
| PR n (%)                                 | 25 (34)  | 52 (36)  |
| nCR n (%)                                | 4 (5)  | 9 (6)  |
| <b>Stopa odgovora u 8 ciklusa n (%)</b>  |  |  |
| ORR (CR+PR)                              | 38 (52)  | 76 (52)  |
| p-vrijednost <sup>a</sup>                |  | 0,0001   |



|   |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
| CR n (%)  | 9 (12)       | 15 (10)                 |
| PR n (%)  | 29 (40)      | 61 (42)                 |
| nCR n (%)   | 7 (10)       | 14 (10)                 |
| <b>Populacija uključena u ispitivanje<sup>b</sup></b> |              |                         |
|   | n=74         | n=148                   |
| TTP, mjeseci  | 9,4          | 10,4                    |
| (95% CI)  | (7,6, 10,6)  | (8,5, 11,7)             |
| Omjer hazarda (95% CI) <sup>c</sup>                   |              | 0,839 (0,564,<br>1,249) |
| p-vrijednost <sup>d</sup>                             |              | 0,38657                 |
| <b>Preživljenje bez progresije, mjeseci</b>           |              |                         |
|   | 8,0          | 10,2                    |
| (95% CI)  | (6,7, 9,8)   | (8,1, 10,8)             |
| Omjer hazarda (95% CI) <sup>c</sup>                   |              | 0,824 (0,574,<br>1,183) |
| p-vrijednost <sup>d</sup>                             |              | 0,295                   |
| <b>1-godišnje opće preživljenje (%)<sup>e</sup></b>   |              |                         |
|   | 76,7         | 72,6                    |
| (95% CI)  | (64,1, 85,4) | (63,1, 80,0)            |

<sup>a</sup> p-vrijednost za hipotezu neinferiornosti u SC skupni ostaje na najmanje 60% stope odgovora u IV skupini.

<sup>b</sup> 222 ispitanika bilo je uključeno u ispitivanje; 221 ispitanik bio je liječen s bortezomibom

<sup>c</sup> Procjena omjera hazarda temelji se na Coxovom modelu proporcionalnog rizika prilagođenom prema čimbenicima stratifikacije: ISS stupnjevanje i broj prethodnih linija.

<sup>d</sup> Log rank test prilagođen za čimbenike stratifikacije: ISS stupnjevanje i broj prethodnih linija.

<sup>e</sup> Medijan trajanja praćenja je 11,8 mjeseci

#### *Kombinirano liječenje bortezomibom s pegiliranim liposomalnim doksorubicinom (ispitivanje DOXIL-MMY-3001)*

Randomizirano, otvoreno, multicentrično ispitivanje faze III, usporednih skupina, bilo je provedeno sa 646 bolesnika kod kojih se uspoređivala sigurnost i djelotvornost bortezomiba plus pegilirani liposomalni doksorubicin naspram monoterapija bortezomibom, u bolesnika s multiplim mijelomom koji su barem jednom prethodno liječeni, te kod kojih nije došlo do progresije dok su primali antraciklinsko liječenje. Primarna mjera ishoda djelotvornosti bila je TTP dok su sekundarne mjere ishoda djelotvornosti bile OS ili ORR (CR+PR), prema kriterijima Europske Skupine za Krv i Transplantaciju Srži (EBMT).

Planom ispitivanja definirana prijevremena analiza (temeljeno na 249 TTP događaja) bila je okidač za prijevremeni završetak ispitivanja djelotvornosti. Ova prijevremena analiza je pokazala redukciju TTP rizika za 45 % (95 % CI; 29-57 %,  $p < 0,0001$ ) za bolesnike koji su liječeni kombinacijskom terapijom bortezomiba i pegiliranog liposomalnog doksorubicina. Medijan TTP-a bio je 6,5 mjeseci za bolesnike na monoterapiji bortezomibom u usporedbi s 9,3 mjeseci za bolesnike na kombiniranoj terapiji bortezomibom plus pegilirani liposomalni doksorubicin. Ovi rezultati, iako nisu zreli, sačinjavali su planom ispitivanja definiranu konačnu analizu.

Konačna analiza za ukupno preživljenje (OS) napravljena nakon medijana praćenja u trajanju od 8,6 godina, nije pokazala značajnu razliku u OS između dviju liječenih skupina. Medijan OS bio je 30,8 mjeseci (95% CI; 25,2-36,5 mjeseci) za bolesnike na monoterapiji bortezomibom i 33,0 mjeseci (95% CI; 28,9-37,1 mjeseci) za bolesnike na kombiniranom liječenju bortezomibom s pegiliranim liposomalnim doksorubicinom.

#### *Kombinirano liječenje bortezomibom s deksametazonom*

Radi nepostojanja bilo kakve izravne usporedbe između bortezomiba i bortezomiba u kombinaciji s deksametazonom u bolesnika s progresivnim multiplim mijelomom, provedena je statistička analiza odgovarajućih parova, radi usporedbe rezultata nerandomizirane skupine bortezomiba u kombinaciji s deksametazonom (otvoreno ispitivanje faze II, MMY-2045), s rezultatima koji su dobiveni u skupini na monoterapiji bortezomibom iz različitih ispitivanja faze III (M34101-039 [APEX] i DOXIL MMY-3001), u istoj indikaciji.

Analiza odgovarajućih parova je statistička metoda u kojoj se bolesnici u liječenoj skupini (npr. bortezomib u kombinaciji s deksametazonom) i bolesnici u usporednoj skupini (npr. bortezomib) učine

usporedivima s obzirom na zbunjujuće čimbenike, tako da se individualno uparaju ispitanici u ispitivanju. Ovo umanjuje učinke uočenih zbunjujućih čimbenika kada se procjenjuje učinak liječenja koristeći nerandomizirane podatke.

Identificirano je 127 odgovarajućih parova. Analiza je pokazala poboljšani ORR (CR+PR) (omjer izgleda 3,769; 95% CI 2,045-6,947;  $p < 0,001$ ), PFS (omjer hazarda 0,511; 95% CI 0,309-0,845;  $p=0,008$ ), TTP (omjer hazarda 0,385; 95% CI 0,212-0,698;  $p=0,001$ ) za bortezomib u kombinaciji s deksametazonom nad monoterapijom bortezomibom.

Dostupni su ograničeni podaci o ponovljenom liječenju bortezomibom pri relapsu multiplog mijeloma. Otvoreno ispitivanje faze II s jednom skupinom, MMY-2036 (RETRIEVE), bilo je provedeno kako bi se utvrdile djelotvornost i sigurnost ponovljenog liječenja bortezomibom na stotinu i trideset bolesnika ( $\geq 18$  godina starosti) s multiplim mijelomom koji su prethodno imali barem parcijalan odgovor na režim koji je uključivao bortezomib bili su ponovno liječeni nakon progresije. Najmanje 6 mjeseci nakon prethodne terapije, započela je primjena bortezomiba uz zadnju toleriranu dozu od 1,3 mg/m<sup>2</sup> (n=93) ili  $\leq 1,0$  mg/m<sup>2</sup> (n=37) te je primijenjen 1., 4., 8. i 11. dan svaka 3 tjedna do maksimalno 8 ciklusa, bilo kao jedini lijek ili u kombinaciji s deksametazonom u skladu sa standardnim liječenjem. Deksametazon je bio primijenjen u kombinaciji s bortezomibom u 83 bolesnika u 1. ciklusu, te u dodatnih 11 bolesnika koji su deksametazon primili tijekom ponovnog liječenja bortezomibom. Primarna mjera ishoda bio je najbolje potvrđen odgovor na liječenje procijenjen prema EBMT kriterijima. Ukupna najbolja stopa odgovora (CR + PR), na ponovljeno liječenje u 130 bolesnika, bila je 38,5% (95% CI: 30,1, 47,4).

#### *Klinička djelotvornost kod prethodno neliječenog limfoma plaštenih stanica (MCL)*

Ispitivanje LYM 3002 bilo je randomizirano, otvoreno ispitivanje faze III koje je uspoređivalo djelotvornost i sigurnost kombinacije bortezomiba, rituksimaba, ciklofosfamida, doksorubicina i prednizona (BR-CAP; n=243) s onima kombinacije rituksimaba, ciklofosfamida, doksorubicina, vinkristina, i prednizona (R-CHOP; n=244) u odraslih bolesnika s prethodno neliječenim limfomom plaštenih stanica (Stadij II, III ili IV). Bolesnici u skupini liječenoj s BR-CAP primili su bortezomib (1,3 mg/m<sup>2</sup>; 1., 4., 8., 11. dan, dani perioda odmora 12-21), rituksimab 375 mg/m<sup>2</sup> i.v. 1. dan; ciklofosamid 750 mg/m<sup>2</sup> i.v. 1. dan; doksorubicin 50 mg/m<sup>2</sup> i.v. 1. dan i prednizon 100 mg/m<sup>2</sup> peroralno 1. do 5. dan 21-dnevnog ciklusa liječenja bortezomibom. Bolesnicima za koje je odgovor na liječenje prvi put zabilježen u 6. ciklusu, primijenjena su dva dodatna ciklusa liječenja. Primarni ishod djelotvornosti bilo je preživljenje bez progresije na temelju ocjene Nezavisnog odbora za procjenu (od engl. *Independent Review Committee*, IRC). Sekundarni ishodi su uključili, vrijeme do progresije (TTP), vrijeme do sljedećeg liječenja limfoma (od engl. *time to next anti-lymphoma treatment*, TNT), trajanje intervala bez liječenja (od engl. *treatment free interval*, TFI), ukupnu stopu odgovora (od engl. *overall response rate*, ORR) i stopu kompletnog odgovora (od engl. *complete response*, CR/CRu), ukupno preživljenje (od engl. *overall survival*, OS) i trajanje odgovora.

Demografski podaci i karakteristike bolesti na početku ispitivanja općenito su bile dobro izbalansirane unutar dvije liječene skupine: medijan dobi bolesnika bio je 66 godina, 74% su bili muškarci, 66% su bili bijele rase, a 32% azijskog porijekla, 69% bolesnika imalo je pozitivan aspirat koštane srži i/ili pozitivnu biopsiju koštane srži na limfom plaštenih stanica, 54% bolesnika imalo je skor Internacionalnog indeksa prognoze (od engl. *International Prognostic Index*, IPI)  $\geq 3$ , i 76% imalo je stadij IV bolesti. Trajanje liječenja (medijan=17 tjedana) i trajanje praćenja (medijan=40 mjeseci) bili su usporedivi u obje liječene skupine. Medijan od 6 ciklusa primili su bolesnici u obje liječene skupine, a 14% ispitanika u BR-CAP skupini i 17% bolesnika u R-CHOP skupini primilo je 2 dodatna ciklusa. Većina bolesnika u obje skupine završilo je liječenje, 80% u BR-CAP skupini i 82% u R-CHOP skupini. Rezultati djelotvornosti prikazani su u Tablici 16:

Tablica 16: Rezultati djelotvornosti iz ispitivanja LYM-3002

| Ishod djelotvornosti                                 | BR-CAP      | R-CHOP      |                                      |
|--|-------------|-------------|--------------------------------------|
| n: ITT bolesnici                                     | 243         | 244         |                                      |
| <b>Preživljenje bez progresije (IRC)<sup>a</sup></b> |             |             |                                      |
| Događaji n (%)                                       | 133 (54,7%) | 165 (67,6%) | HR <sup>b</sup> (95% CI)=0,63 (0,50; |

|   |                   |                 |   |
|---|-------------------|-----------------|---|
| Medijan <sup>c</sup> (95% CI) (mjeseci)             | 24,7 (19,8; 31,8) | 14,4 (12; 16,9) | 0,79<br>p-vrijednost <sup>d</sup> < 0,001   |
| <b>Stopa odgovora</b>                               |                   |                 |   |
| n: bolesnici procjenjivi na odgovor                 | 229               | 228             |   |
| Ukupni kompletni odgovor (CR+CRu) <sup>f</sup> n(%) | 122 (53,3%)       | 95 (41,7%)      | OR <sup>e</sup> (95% CI)=1,688 (1,148; 2,481)<br>p-vrijednost <sup>g</sup> =0,007 |
| Ukupni odgovor (CR+CRu+PR) <sup>h</sup> n(%)        | 211 (92,1%)       | 204 (89,5%)     | OR <sup>e</sup> (95% CI)=1,428 (0,749; 2,722)<br>p-vrijednost <sup>g</sup> =0,275 |

<sup>a</sup> Temeljeno na ocjeni Nezavisnog odbora za procjenu (IRC) (samo radiološki podaci).

<sup>b</sup> Procjena omjera hazarda temelji se na Coxovom modelu stratificiranom prema IPI riziku i stadiju bolesti. Omjer hazarda < 1 ukazuje na prednost za BR-CAP.

<sup>c</sup> Temeljeno na Kaplan-Meierovim procjenama.

<sup>d</sup> Temeljeno na Log rank testu stratificiranom s IPI rizikom i stadijem bolesti.

<sup>e</sup> Koristi se Mantel-Haenszelova procjena zajedničkog omjera izgleda za stratificirane tablice, s IPI rizikom i stadijem bolesti kao stratifikacijskim faktorima. Omjera izgleda (OR) > 1 ukazuje na prednost za BR-CAP.

<sup>f</sup> Uključuje sve CR + CRu, prema IRC, koštanu srž i LDH.

<sup>g</sup> P-vrijednost Cochran Mantel-Haenszelovog hi-kvadrat testa, s IPI i stadijem bolesti kao stratifikacijskim faktorima.

<sup>h</sup> Uključuje sve radiološke CR+CRu+PR prema IRC neovisno o potvrdi koštanom srži i LDH.

CR=Kompletni odgovor; CRu=Nepotvrđeni kompletni odgovor; PR=Djelomični odgovor; CI=Interval pouzdanosti, HR=Omjer hazarda; OR=Omjer izgleda; ITT=Populacija namijenjena za liječenje

Medijan preživljenja bez progresije prema procjeni ispitivača bio je 30,7 mjeseci u BR-CAP skupini i 16,1 mjeseci u R-CHOP skupini (omjer hazarda [HR]=0,51; p < 0,001). Statistički značajna korist (p < 0,001) za BR-CAP liječenu skupinu u odnosu na R-CHOP skupinu bila je zapažena za TTP (medijan 30,5 naspram 16,1 mjesec), TNT (medijan 44,5 naspram 24,8 mjeseci) i TFI (medijan 40,6 naspram 20,5 mjeseci). Medijan trajanja kompletnog odgovora bio je 42,1 mjesec u BR-CAP skupini u usporedbi s 18 mjeseci u R-CHOP skupini. Trajanje ukupnog odgovora bilo je 21,4 mjeseca duže u BR-CAP skupini (medijan 36,5 mjeseci naspram 15,1 mjeseci u R-CHOP skupini). Konačna analiza OS provedena je nakon medijana praćenja od 82 mjeseca. Medijan OS bio je 90,7 mjeseci za BR-CAP skupinu u usporedbi s 55,7 mjeseci za R-CHOP skupinu (HR 0,66; p=0,001). Uočena razlika konačnih medijana OS između dvije liječene skupine bila je 35 mjeseci.

#### Bolesnici prethodno liječeni zbog amiloidoze lakih lanaca (AL)

Provedeno je ispitivanje otvorenog, nerandomiziranog tipa faze I/II da bi se utvrdila sigurnost i djelotvornost primjene bortezomiba u bolesnika prethodno liječenih zbog amiloidoze lakih lanaca (AL). Nisu bili primijećeni novi sigurnosni pokazatelji tijekom ispitivanja, a konkretno bortezomib nije pogoršao oštećenja ciljnih organa (srce, bubreg i jetra). U eksplorativnoj analizi djelotvornosti, stopa odgovora od 67,3% (uključujući CR stopu od 28,6%) prema mjerenju hematološkog odgovora (M-protein) bila je zabilježena u 49 procijenjenih bolesnika liječenih maksimalnim dopuštenim dozama od 1,6 mg/m<sup>2</sup> na tjedan i 1,3 mg/m<sup>2</sup> dvaput na tjedan. U ovim kohortama prema dozi, kombinirana stopa jednogodišnjeg preživljenja iznosila je 88,1%.

#### Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja bortezomiba u svim podskupinama pedijatrijske populacije u multiplom mijelomu i u limfomu plaštenih stanica (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

Ispitivanje faze II u kojem su se ispitivali aktivnost, sigurnost i farmakokinetika u jednoj skupini bolesnika, provedeno od strane Skupine za dječju onkologiju (engl. *Childrens Oncology Group*), procijenilo je aktivnost dodavanja bortezomiba u ponovno uvedenu kemoterapiju s više lijekova u pedijatrijskih i mladih odraslih bolesnika s limfoidnim malignim bolestima (pre-B-stanična akutna limfoblastična leukemija [ALL], T-stanična ALL i T-stanični limfoblastični limfom [LL]). Učinkovito ponovno uvođenje režima kemoterapije s više lijekova bilo je primijenjeno u 3 bloka. Bortezomib je bio primijenjen samo u 1. i 2.bloku zbog izbjegavanja mogućeg preklapanja toksičnosti s istodobno primijenjenim lijekovima u bloku 3.

Kompletni odgovor (engl. *complete response*, CR) bio je procijenjen na kraju 1. bloka. U bolesnika s B-staničnom ALL s relapsom unutar 18 mjeseci od dijagnoze (n = 27) stopa potpunog odgovora bila je 67% (95% CI: 46, 84); stopa četveromjesečnog preživljenja bez događaja bila je 44% (95% CI: 26, 62). U bolesnika s B-staničnom ALL s relapsom unutar 18-36 mjeseci od dijagnoze (n = 33) stopa potpunog odgovora bila je 79% (95% CI: 61, 91) i stopa četveromjesečnog preživljenja bez događaja bila je 73% (95% CI: 54, 85). Stopa potpunog odgovora u bolesnika s T-staničnom ALL s prvim relapsom (n = 22) bio je 68% (95% CI: 45, 86) i stopa četveromjesečnog preživljenja bez događaja bila je 67% (95% CI: 42, 83). Prijavljeni podaci o djelotvornosti smatraju se neuvjerljivima (vidjeti dio 4.2).

Ukupno je bilo uključeno i procijenjeno na sigurnost 140 bolesnika s ALL ili LL; medijan dobi bio je 10 godina (raspon od 1 do 26). Nisu zabilježena nova sigurnosna pitanja kada je bortezomib bio dodan standardnoj osnovnoj pedijatrijskoj kemoterapiji za pre-B-staničnu ALL. Sljedeće nuspojave (stupnja  $\geq 3$ ) zabilježene su u većoj incidenciji kod režima liječenja koji sadrži bortezomib u usporedbi s ispitivanjem s povijesnom kontrolom u kojem je osnovni režim davan samostalno: u 1. bloku periferna senzorna neuropatija (3% naspram 0%); ileus (2,1% naspram 0%); hipoksija (8% naspram 2%). Nisu dostupne informacije o mogućim posljedicama ili stopama povlačenja periferne neuropatije u ovom ispitivanju. Također su zabilježene više incidencije za infekcije sa stupnjem  $\geq 3$  neutropenije (24% naspram 19% u 1. bloku i 22% naspram 11% u 2. bloku), povišen ALT (17% naspram 8% u 2. bloku), hipokalemija (18% naspram 6% u 1. bloku i 21% naspram 12% u 2. bloku), te hiponatrijemija (12% naspram 5% u 1. bloku i 4% naspram 0 u 2. bloku).

## 5.2 Farmakokinetička svojstva

### Apsorpcija

Nakon intravenske primjene bolus doze od 1,0 mg/m<sup>2</sup> odnosno 1,3 mg/m<sup>2</sup> u 11 bolesnika s multiplim mijelomom čije su vrijednosti klirensa kreatinina bile više od 50 ml/min, srednje vrijednosti maksimalne koncentracije bortezomiba u plazmi nakon prve doze iznosile su 57 odnosno 112 ng/ml. Nakon sljedećih doza, primijećene srednje vrijednosti maksimalne koncentracije u plazmi bile su u rasponu od 67 do 106 ng/ml kod doze od 1,0 mg/m<sup>2</sup> i 89 do 120 ng/ml kod doze od 1,3 mg/m<sup>2</sup>.

Nakon intravenske bolusne ili supkutane injekcije u dozi od 1,3 mg/m<sup>2</sup> primijenjene bolesnicima s multiplim mijelomom (n=14 u intravenskoj skupini, n=17 u supkutanoj skupini), ukupna sistemska izloženost nakon primjene ponovljenih doza (AUC<sub>trajanja</sub>) bila je jednaka za supkutane i intravenske primjene. C<sub>max</sub> nakon supkutane primjene (20,4 ng/ml) bila je niža nego kod intravenske primjene (223 ng/ml). AUC<sub>trajanja</sub> omjera geometrijske sredine bila je 0,99; a 90% interval pouzdanosti bio je 80,18% - 122,80%.

### Distribucija

Prosječni volumen distribucije (Vd) bortezomiba kretao se u rasponu od 1659 l do 3294 l nakon jednokratne ili ponovljene intravenske primjene doze od 1,0 mg/m<sup>2</sup> ili 1,3 mg/m<sup>2</sup> bolesnicima s multiplim mijelomom. Ovi podaci ukazuju da se bortezomib znatno distribuira u periferna tkiva. U rasponu koncentracije bortezomiba od 0,01 do 1,0 µg/ml, vezanje za proteine ljudske plazme *in vitro* u prosjeku je iznosilo 82,9%. Udio bortezomiba vezanog za proteine plazme nije ovisio o koncentraciji.

### Biotransformacija

*In vitro* ispitivanja na mikrosomima ljudske jetre i ljudskim izoenzimima citokroma P450 s ekspresijom cDNK pokazuju da se bortezomib primarno metabolizira oksidacijom putem enzima citokroma P450, 3A4, 2C19 i 1A2. Glavni metabolički put je deboronacija čime se oblikuju dva deboronirana metabolita koji se nakon toga hidrosiliraju do nekoliko metabolita. Deboronirani metaboliti bortezomiba ne djeluju kao inhibitori 26S proteasoma.

### Eliminacija

Prosječno poluvrijeme eliminacije (t<sub>1/2</sub>) bortezomiba nakon višekratnog doziranja kretao se u rasponu od 40-193 sata. Bortezomib se brže eliminira nakon prve doze u usporedbi sa sljedećim dozama. Srednji ukupni tjelesni klirens nakon prve doze iznosio je 102 l/h kod doze od 1,0 mg/m<sup>2</sup> i 112 l/h kod doze od 1,3 mg/m<sup>2</sup>, a nakon sljedećih doza kretao se u rasponu od 15 to 32 l/h kod doze od 1,0 mg/m<sup>2</sup> i 18 do 32 l/h kod doze od 1,3 mg/m<sup>2</sup>.



### Posebne populacije

#### *Oštećenje funkcije jetre*

Učinak oštećenja jetre na farmakokinetiku bortezomiba procijenio se u ispitivanju faze I tijekom prvog ciklusa liječenja, uključujući primarno 61 bolesnika s primarno solidnim tumorima i raznim stupnjevima oštećenja jetre u dozama bortezomiba u rasponu od 0,5 do 1,3 mg/m<sup>2</sup>.

U usporedbi s bolesnicima s normalnom funkcijom jetre, blago oštećenje funkcije jetre nije promijenilo prema dozi normalizirani AUC bortezomiba. Međutim, srednje vrijednosti AUC normalizirane prema dozi bile su povećane za približno 60% u bolesnika s umjerenim ili teškim oštećenjem funkcije jetre. U bolesnika s umjerenim ili teškim oštećenjem jetre preporučuje se niža početna doza i te bolesnike treba pomno pratiti (vidjeti dio 4.2, tablica 6).

#### *Oštećenje funkcije bubrega*

Provedeno je farmakokinetičko ispitivanje u bolesnika s različitim stupnjevima oštećenja bubrega koji su bili podijeljeni prema vrijednostima klirensa kreatinina (CrCL) u sljedeće skupine: normalno (CrCL  $\geq$  60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, n=12), blago (CrCL=40-59 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, n=10), umjereno (CrCL=20-39 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, n=9) i teško (CrCL < 20 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, n=3). Skupina bolesnika na dijalizi koji su primali dozu nakon dijalize također je bila uključena u ispitivanje (n=8). Bolesnicima su bile primijenjene intravenske doze od 0,7 do 1,3 mg/m<sup>2</sup> bortezomiba dva puta na tjedan. Izloženost bortezomibu (prema dozi normalizirani AUC i C<sub>max</sub>) bila je usporediva unutar svih skupina (vidjeti dio 4.2).

#### *Dob*

Farmakokinetika bortezomiba bila je okarakterizirana nakon primjene intravenske bolusne injekcije dva puta tjedno u dozi od 1,3 mg/m<sup>2</sup> u 104 pedijatrijska bolesnika (u dobi od 2-16 godina) s akutnom limfoblastičnom leukemijom (ALL) ili akutnom mijeloidnom leukemijom (AML). Na temelju populacijske farmakokinetičke analize klirens bortezomiba povećava se s porastom površine tijela (engl. *body surface area*, BSA). Geometrijska sredina (%CV) klirensa bila je 7,79 (25%) l/h/m<sup>2</sup>, volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže bio je 834 (39%) l/m<sup>2</sup>, i poluvijek eliminacije bio je 100 (44%) sati. Nakon korekcije za BSA učinak, drugi demografski podaci poput dobi, tjelesne težine i spola nisu imali klinički značajne učinke na klirens bortezomiba. BSA-normalizirani klirens bortezomiba u pedijatrijskih bolesnika bio je sličan onim zabilježenim u odraslih.

### **5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene**

Pri koncentracijama od samo 3,125  $\mu$ g/ml, što je bila najniža koncentracija koja se ispitivala, bortezomib je pokazao klastogenu aktivnost (strukturne kromosomske aberacije) u *in vitro* testu kromosomske aberacije na stanicama jajnika kineskog hrčka (CHO od engl. *Chinese hamster ovary*). Bortezomib nije bio genotoksičan kad se ispitivao *in vitro* mutagenim testom (Amesov test) i *in vivo* mikronukleusnim ispitivanjem u miševa.

Ispitivanja razvojne toksičnosti u štakora i kunića pokazala su embrio-fetalne letalne učinke pri dozama toksičnima za majku, ali nije bilo izravne embrio-fetalne toksičnosti u dozama nižim od onih toksičnih za majku. Nisu provedena ispitivanja utjecaja na plodnost, ali napravljena je procjena reproduktivnih tkiva u ispitivanjima opće toksičnosti. U šestomjesečnom ispitivanju na štakorima primijećeni su degenerativni učinci na testise i jajnike. Stoga postoji velika vjerojatnost da bi bortezomib mogao utjecati na plodnost kako u mužjaka, tako i u ženke. Nisu provedena ispitivanja utjecaja na perinatalni i postnatalni razvoj.

U ispitivanjima opće toksičnosti u više ciklusa koja su provedena u štakora i majmuna, glavni ciljni organi bili su probavni sustav, što se očitivalo povraćanjem i/ili proljevom; hematopoetska i limfatična tkiva što se očitivalo citopenijama u perifernoj krvi, atrofijom limfnog tkiva i krvotvornom hipocelularnošću koštane srži; periferna neuropatija (primijećena u majmuna, miševa i pasa) koja je uključivala aksone senzornih živaca; i blage promjene na bubrezima. Svi ti ciljni organi djelomično su se ili potpuno oporavili nakon prestanka liječenja.

Na temelju ispitivanja na životinjama čini se da je prolazak bortezomiba kroz krvno-moždanu barijeru



ograničen, ako uopće postoji, a važnost tog nalaza za ljude nije poznata.

Ispitivanja kardiovaskularne sigurnosne farmakologije u majmuna i pasa pokazala su da su intravenske doze koje su približno dva do tri puta veće od preporučene kliničke doze izražene na temelju  $\text{mg}/\text{m}^2$  povezane s povećanjem broja otkucaja srca, smanjenjem kontraktilnosti, hipotenzijom i smrću. U pasa su smanjena srčana kontraktilnost i hipotenzija reagirale na akutnu intervenciju primjene lijekova s pozitivnim inotropnim učinkom ili presornih lijekova. Štoviše, u ispitivanjima na psima bilo je primijećeno blago povećanje korigiranog QT intervala.

## **6. FARMACEUTSKI PODACI**

### **6.1 Popis pomoćnih tvari**

manitol (E 421)

### **6.2 Inkompatibilnosti**

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

### **6.3 Rok valjanosti**

Neotvorena bočica

3 godine

Rekonstituirana otopina

Dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost pripremljene otopine od 8 sati na  $25^{\circ}\text{C}/60\%$  RV na tamnom mjestu, u bočici i u polipropilenskoj štrcaljki.

S mikrobiološkog stajališta, osim ako metoda rekonstitucije/razrjeđivanja ne isključuje rizik od mikrobiološke kontaminacije, lijek se mora primijeniti odmah. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja pripremljene otopine odgovornost su korisnika.

### **6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka**

Bočicu čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi.

Za uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka, vidjeti u dijelu 6.3.

### **6.5 Vrsta i sadržaj spremnika**

BORTEZOMIB PHARMAS 3,5 mg pakiran je u bezbojnu staklenu 10R bočicu (staklo tip I) (nominalnog volumena 10 ml) s brombutilnim gumenim čepom i plavom „flip-off“ kapicom. Svako pakiranje sadrži 1 bočicu za jednokratnu primjenu.

### **6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom**

Opće mjere opreza

Bortezomib je citotoksično sredstvo. Stoga, potreban je oprez tijekom rukovanja i pripreme lijeka BORTEZOMIB PHARMAS. Preporučuje se nošenje rukavica i druge zaštitne odjeće kako bi se spriječio dodir s kožom.

**Aseptična tehnika** mora se strogo poštovati tijekom cijelog postupka rukovanja lijekom BORTEZOMIB PHARMAS, budući da lijek ne sadrži konzervans.

Nenamjerna intratekalna primjena bortezomiba dovela je do smrtnih slučajeva. BORTEZOMIB PHARMAS 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju namijenjen je za intravensku ili supkutanu primjenu.

BORTEZOMIB PHARMAS se ne smije primijeniti intratekalno.

#### Upute za rekonstituciju

BORTEZOMIB PHARMAS mora rekonstituirati zdravstveni djelatnik.

#### Intravenska injekcija

Svaku 10R bočicu (nominalnog volumena 10 ml) lijeka BORTEZOMIB PHARMAS mora se pažljivo rekonstituirati pomoću 3,5 ml 0,9 %-tne otopine natrijevog klorida za injekciju (9 mg/ml), uz korištenje štrcaljke odgovarajuće veličine, bez uklanjanja čepa bočice. Otapanje liofiliziranog praška traje manje od 2 minute.

Nakon rekonstitucije, jedan ml otopine sadrži 1 mg bortezomiba. Rekonstituirana otopina je bistra i bezbojna, uz konačnu vrijednost pH od 4 do 7.

Prije primjene pripremljenu otopinu treba vizualno pregledati na prisutnost čestica i promjenu boje. Ako se primijeti promjena boje ili prisutnost čestica, pripremljenu otopinu treba baciti.

#### Supkutana injekcija

Svaku 10R bočicu (nominalnog volumena 10 ml) lijeka BORTEZOMIB PHARMAS mora se pažljivo rekonstituirati pomoću 1,4 ml 0,9 %-tne otopine natrijevog klorida za injekciju (9 mg/ml), uz korištenje štrcaljke odgovarajuće veličine, bez uklanjanja čepa bočice. Otapanje liofiliziranog praška traje manje od 2 minute. Nakon rekonstitucije, jedan ml otopine sadrži 2,5 mg bortezomiba. Rekonstituirana otopina je bistra i bezbojna, uz konačnu vrijednost pH od 4 do 7. Prije primjene rekonstituiranu otopinu treba vizualno pregledati na prisutnost čestica i promjenu boje. Ako se primijeti promjena boje ili prisutnost čestica, pripremljenu otopinu treba baciti.

#### Zbrinjavanje

BORTEZOMIB PHARMAS je samo za jednokratnu primjenu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

### **7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

PharmaS d.o.o.  
Radnička cesta 47  
10000 Zagreb

### **8. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

HR-H-002821692

### **9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA**

03.06.2015./15.05.2020.

### **10. DATUM REVIZIJE TEKSTA**

14. siječanj 2021.